

Modifiche linee guida nazionali /difesa aprile 2018

Coltura	Aversità	Sostanza attiva	Decisione
<b>FRUTTICOLE E VITE</b>			
Arancio e mandarino	acarari: <i>Panonychus ulmi</i> e <i>Tetranychus urticae</i>	acequinochl	inserire
Arancio, limone, mandarino, clementino, tacle, pompelmo, pomelo, tangelo, tangelo, tangerino, bergamotto, chinotto, cedri	afide verde degli agrumi (Aphis spiraeola), afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afide marrone degli agrumi (Aphis citricidus), afide del cotone e delle cucurbitacee (Toxoptera aurantii), cocciniglia bianca-rossa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii), cocciniglia farinosa degli agrumi (Planococcus citri)	sulfoxafflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pesche, nettarine, ciliege, visciole/amarene, ciliegie nere, mirabolane, giuggiole	afide verde del pesco (Myzus persicae), afide nero del ciliegio (Myzus cerasi), afide farinoso del susino (Hyalopterus pruni), afide verdastro piccolo del susino (Brachycaudus helichrysi), cocciniglia bianca del pesco (Pseudalacaspis pentagona), cocciniglia di San Jose (Quadraspidiotus perniciosus)	sulfoxafflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Fragola	Oidio ( <i>Podosphaera macularis</i> ), Micospferella ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp.)	ciflufenamid + difenconazolo	inserire max 2 trattamenti nell'ambito del gruppo dei CS
Fragola cp	oidio	olio essenziale di arancio	inserire

Fragola	oidio	flutriafol	inserire nei limiti degli IBE
Fragola cp	spodoptora	spinosad	inserire
Fragola	drosophila	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Lampone, ribes nero, uva spina	drosophila	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Melo	ticchiolatura	fosfonato di potassio	inserire max 6 trattamenti all'anno
Melo	psille	piretrine pure	inserire solo nei disciplinari di Province autonome e Regioni interessate dall'avversità
Melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, nashi	afide verde del melo (Aphis pomi), afide grigio del melo (Dysaphis plantaginea), afide lanigero (Eriosoma lanigerum), cocciniglia di San Jose (Quadraspidiotus perniciosus)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pero	ticchiolatura	fosfonato di potassio	inserire max 6 trattamenti all'anno
Pesco	cimice asiatica	lambda-cialotrina	inserire max 1 trattamento nei limiti dei piretroidi
Olivo	sputacchina	deltametrina	inserire solo nei disciplinari delle Regioni interessate dall'avversità
Olivo	Tignola dell'olivo (Prays oleae)	dimetoato	inserire nei limiti della s.a.
Vite da tavola, Mandorlo	sputacchina	deltametrina	inserire solo nei disciplinari delle Regioni interessate dall'avversità
Vite	peronospora	oxathiapiprolin	inserire max 2 trattamenti
Vite da Tavola	fitoregolatore: facilita la cascola degli acini partenocarpici agevolando il controllo dell'acinellatura	metamitron	inserire

**Diserbo**

Melo, Pero, Nespolo del Giappone, Cotogno, Pesco, Nettareno, Albicocco, Susino, Ciliegio, Vite, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Pompelmo, Chinotto, Bergamotto, Cedro, Frutta a guscio	diserbo - gramincidi	propaquizafop	inserire
Olivo	post-emergenza delle infestanti a foglia larga in autunno o fine inverno-inizio primavera	Tribenuron metile	inserire
pomacee, drupacee, vite, actinidia, frutta a guscio, piccoli frutti, vivai e piante non in produzione di pomacee, drupacee, vite, actinidia, frutta a guscio e piccoli frutti	diserbo pre-emergenza	Isoxaben + oryzalin	inserire
vite in produzione oltre il terzo anno	diserbo pre-emergenza	penoxulam	inserire
<b>ORTICOLE</b>			
Erbe fresche, basilico e prezemolo	marciumi e peonospora	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i>	inserire
erbe fresche, basilico, prezemolo	peronospora	dimetomorf	inserire nei limiti dei CAA

Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, cavoli di Bruxelles, cavolo, cinese, cime di rapa - pieno campo	afide ceroso del cavolfiore (Brevicoryne brassicae), afide verde del pesco (Myzus persicae)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
cavoli a testa	peronospora	propamocarb	escludere
cavoli a testa	notte	lambdacialotrina + clorantraniliprole	escludere
cavoli di Bruxelles	afidi, notte, tignola delle crucifere	azadiractina	inserire
cavoli di Bruxelles	afidi	tau-fluvalinate	inserire
Cicoria, indivia, radicchio e scarola (in pieno campo)	notte	tebufenozide	inserire
Cicorino cp	bremia, sclerotinia	azoxystrobin	inserire
Crescione	triptidi	acrinatrina	escludere
Cucurbitacee	oidio e cancro gommoso	fluxapiroxad + difenoconazolo	non inserire
funghi coltivati	mal della tela ( <i>Cladobotryum</i> – sin. <i>Dactylium - dendroides</i> )	metrafenone	inserire
germogli e foglie di brassica	sclerotinia	azoxystrobin	inserire
Lattughe pc	peronospora	oxathiapirrolin	inserire pc max 3 per anno e max 2 per ciclo
Lattuga baby leaf	peronospora	dimetomorf	inserire nel limite dei CAA
Lattughe e altre insalate (in pieno campo)	notte	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide

Lattughe, foglie di spinaci pieno campo	afide della lattuga (Nasonovia ribisnigri), afide verde del pesco (Myzus persicae)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
indivia riccia, scarola, radicchio	nottue e miridi	etofenprox	modificare nota da: max 2 trattamenti/cici in: max 2 trattamenti/anno
indivia riccia, scarola, radicchio	nottue	lambdacialotrina + ciorantraniliprole	escludere
cicoria, indivia, radicchio e scarola, lattuga e rucola (in serra)	sclerotinia	azoxystrobin	inserire in serra su Bremia, su sclerotinia sia in serra che pieno campo con i limiti delle strobilurine
dolcetta	Bremia	azoxystrobin	inserire con i limiti delle strobilurine
dolcetta	peronospora	dimetomorf	inserire max 2 trattamenti/anno di dimetomorf da solo o in miscela
lattuga	peronospora	benalaxyl	escludere
lattughino	peronospora	benalaxyl	escludere
lattughino	nottue	tebufenozide	inserire
lattughino	peronospora	dimetomorf	inserire max 2 trattamenti/anno nei limiti dei CAA
lattughino	miridi	etofenprox	modificare nota da: max 1 trattamento/taglio in: max 2 trattamenti/anno
lattughino	rizzoctonia	tolclofos-metile	inserire nota: ammesso solo in coltura protetta
lattughino	peronospora	propamocarb + foseyl - Al	escludere
lattughino	peronospora	fenamidone	modificare in: fenamidone + foseyl - Al
lattughino	Bremia, sclerotinia	azoxystrobin	inserire

Patata pc	peronospora	oxathiapiprolin	inserire max 3
Patata	afide verde del pesco ( <i>Myzus persicae</i> ), afide del ramno ( <i>Aphis nasturtii</i> ), afide nero della fava ( <i>Aphis fabae</i> ), afidone verde della patata ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ), afide grande della rosa ( <i>Aphis gossypii</i> ), afide a macchie verdi della patata ( <i>Aulacorthum solani</i> )	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Peperone cp	nottue e tuta assoluta	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su nottue; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
Peperone cp	acari	pyridaben	inserire
Peperone cp	<i>Ostrinia nubilalis</i> (piralide del mais)	Feromone per la lotta con il metodo della confusione sessuale	inserire
Pomodoro, peperone, melanzana, peperoni piccanti, pepino in pieno campo e serra	afide delle cucurbitacee ( <i>Aphis gossypii</i> ), afide verde del pesco ( <i>Myzus persicae</i> ), afidone verde della patata ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ), aleurodide delle serre ( <i>Trialleurodes vaporariorum</i> ), aleurodide del tabacco ( <i>Bemisia tabaci</i> )	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Pomodoro pc e cp	peronospora	oxathiapiprolin	inserire pc max 3
Pomodoro cp	peronospora	amisulbrom	inserire max 3 trattamenti fra amisulbrom e cyazofamide
Pomodoro (in coltura protetta)	nottue e Tuta assoluta	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide su nottue; inserire su tuta assoluta; max 2 interventi indipendentemente dall'avversità

prezemolo	notte	deltametrina	inserire nota: ammessa solo in pieno campo
Sedano	mosca minatrice	clromazina	escludere
Spinacio	afidi	sulfoxaflor	inserire in alternativa all'acetamiprid max 2 trattamenti
spinacino	afidi	spirotriamat	escludere
Rucola	notte, tripidi, miridi	etofenprox	modificare nota da: max 1 trattamento/taglio in: max 2 trattamenti/anno
Rucola	notte	tebufenozide	inserire in alternativa al metoxifenozide
Rucola IV gamma	tripidi, Liriomyza	abamectina	inserire nota: ammessa solo su baby leaf
Zucchine, cetrioli, zucche, meloni, angurie in pieno campo e serra	Contro afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afide verde del pesco (Myzus persicae), afide del ramno (Aphis nasturtii), afide nero della fava (Aphis fabae), aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi
Bulbose, ornamentali e floreali (in pieno campo e serra)	afide verde del pesco (Myzus persicae), afide nero della fava (Aphis fabae), afidone verde della patata (Macrosiphum euphorbiae), afide della rosa (Macrosiphum rosae), afide grande della rosa (Aphis gossypii), afide ceroso del faggio (Phyllaphis fagi), aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci)	sulfoxaflor	inserire con le stesse limitazioni dei neonicotinoidi

Floreali ed ornamentali cp	Acari, Afidi, Aleurodidi	maltodestrina	inserire
garofano, floricole e ornamentali	peronospora	metiram	escludere
floreali e ornamentali	marciumi (sclerotinia e rizoctonia)	procloraz	escludere
floreali e ornamentali	afidi e tortricidi	etofenprox	escludere
floreali e ornamentali	tripidi	etofenprox	inserire
floreali e ornamentali	aleurodidi e tortricidi	diflubenzuron	escludere
<b>Diserbo</b>			
Asparago	diserbo post-raccolta, prima emissione della vegetazione estiva (pre-ricaccio)	metribuzin	inserire
Asparago	diserbo pre-emergenza, applicabile in pre-ricaccio o dopo la raccolta	Isoxaben + oryzalin	inserire max 1 trattamento/anno solo sul 75% della superficie in pre-emergenza
asparago, cavoli ad infiorescenza, cavolo rapa, cece, cipolla, fagiolo, pisello, porro, scalogno,	diserbo	piridate	correggere il target sulle infestanti: eliminare le graminacee e inserire in base alle indicazioni di etichetta (post-emergenza/trapianto)
bietola da foglia e da costa pieno campo	diserbo	ciclossidim	escludere
Carciofo	diserbo post-emergenza	propaquizafop	escludere
Cavolfiore	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
Cece, fava, favino, lenticchia	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserire
Cece, fava, lenticchia	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno

Cicoria, indivia riccia e scarola, rucola, dolcetta, cicorino, foglie e germogli di brassica, baby leaf (comprese le brassicacee)	diserbo post-emergenza	propaquizafop	escludere
dolcetta	diserbo post-emergenza	quizalofop p etile	escludere
Finocchio trapiantato	diserbo post-trapianto	metribuzin	inserire
Mais dolce	diserbo Pre-emergenza: dicotiledoni e graminacee	isoxaflutole + cyprosulfamide (antidoto)	inserire
Melanzana	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
orticole	diserbo	acido pelargonico	inserire dove previsto il diserbo chimico
Pisello	diserbo pre-emergenza	metribuzin	inserire
Pomodoro pc	diserbo pre-emergenza	metribuzin	escludere dal diserbo pre-emergenza
Rucola	diserbo	quizalofop p etile	escludere
Scalognò	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
spinacino	diserbo	fenmediphan	escludere
valeriana	diserbo	quizalofop p etile	escludere
Zucca	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
<b>ESTENSIVE</b>			
Erba medica	diserbo post-emergenza	propaquizafop	inserire 1 solo trattamento all'anno
colza	altica, meligete	acetamiprid	escludere

Erba medica	Infestanti dicotiledoni - post-emergenza precoce	bentazone + Imazamox	inserire impiegabile solo primo anno
Fruento, orzo, segale, tritcale	diserbo di post-emergenza dicotiledoni e graminacee	diffufenican + florasulam + iodosulfuron + cloquintocet mexil (antidoto)	inserire solo su orzo
Mais	diserbo in post emergenza	piridate	inserire
Sola	diserbo di pre o post-emergenza precoce	bifenox	inserire
Sorgo	diserbo in post emergenza	fluroxipir	inserire