

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici Contenere lo sviluppo vegetativo e favorire l'areggiamento dei frutti				
Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	Interventi agronomici: evitare l'impianto in zone soggette a ristagni di acqua o in terreni poco permeabili; - effettuare interventi di drenaggio Intervenire solo sugli impianti colpiti	Prodotti rameici Metalaxil-M Fosetyl Al	 (*) 		 * Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno Sospendere i trattamenti almeno 180 giorni prima della raccolta
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas spp.</i>)	Interventi agronomici - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 214/2005 - effettuare concimazioni equilibrate - effettuare una potatura che consenta un buon areggiamento della chioma - effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari (benzalconio cloruro) - disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi - evitare irrigazioni sovrachiuma - monitorare frequentemente gli impianti - tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm. al disotto dell'area colpita	Prodotti rameici <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Acibenzolar-S-metile	(*) 6* 		 * Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Da impiegare preferibilmente in fioritura
Cocciniglia (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Interventi agronomici: - eliminazione dei rami più infestati - spazzolatura delle branche Soglia: Presenza in corrispondenza della fuoriuscita delle neanidi di prima generazione. Solo dove si abbia esperienza di danno sui frutti è ammesso un secondo intervento.	Olio minerale Spirotetramat	(*) 1		 (*) Non impiegare dopo la "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con lo zolfo
Cicaline (<i>Empoasca vitis</i>)	Nessun trattamento				
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Soglia: presenza del fitofago.	Deltametrina Etofenprox	2 1	3	

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità