

Controllo Integrato delle infestanti di: Cicoria

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|---|---------------------------------|---|------|
| Pre semina o Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) Benfluralin Acido pelargonico | |
| Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Pendimetalin | |
| Pre trapianto Pre-semina Post-trapianto Post-emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Propizamide | |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | | |
| Post emergenza | Graminacee | Ciclossidim | |

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$, ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.