

Controllo Integrato delle infestanti di: Carciofo

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVE	NOTE
Pre trapianto	Dicotiledoni		
Trapianto	e	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre ricaccio	Graminacee	Acido Pelargonico	
Pre trapianto Pre ricaccio	Dicotiledoni	Aclonifen	
Post-trapianto	Dicotiledoni e	Oxifluorfen (1) (2)	(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre
Pre-ricaccio			e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file
Post-ricaccio		Pendimethalin	(2) Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella.
		Metazaclor	
		Aclonifen	
		Glifosate (*)	(*) evitare il contatto con la coltura, tramite l'uso di attrezzature schermanti
Post - trapianto e	Dicotiledoni	Piridate	
Post - ricaccio	Graminacee	Quizalofop etile isomero D	
		Quizalofop-p-etile	
		Clethodim	

Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree: ogni azienda per singolo anno (1 gennaio-31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo (2 l/ha x n. ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate, nel rispetto dell'etichetta del formulato.