

## Difesa Integrata di: Lupinella

AVVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Mal bianco - Oidio</b>	<b>Interventi agronomici</b> -preferire gli ecotipi locali più resistenti alla malattia; -sfalci tempestivi;				Non sono ammessi trattamenti.
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia trifoliorum</i>	<b>Interventi agronomici</b> -evitare i terreni argillosi o umidi; -è opportuno che la coltura non torni sullo stesso terreno prima di due anni.;				Ammessa solo la concia del seme.
<b>Altre crittogame</b>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di seme conciato.				Non sono ammessi trattamenti.
<b>Tonchi</b> <i>Bruchus spp.</i> <i>Acanthoscelides</i>	Dannosi solo sulla coltura da seme.  <b>Interventi agronomici</b> -evitare di ritardare in modo eccessivo la trebbiatura onde impedire lo sfarfallamento in campo; -impiego di seme non infestato per la semina. <b>Interventi chimici</b> -disinfestazione del seme in magazzino dopo la raccolta.				Non sono ammessi trattamenti.

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità