

Difesa Integrata CECE

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Antracnosi (Ascochyta rabiei)	Interventi agronomici impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	(Boscalid+ Pyraclostrobin) Pyraclostrobin Prodotti rameici (*)	2 2 1	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Oidio (Erysiphe polygoni)	Interventi agronomici -impiego di cultivar resistenti. Interventi chimici - intervenire alla comparsa di sintomi diffusi.	Zolfo			
Ruggine (Uromyces fabae)	Interventi chimici - intervenire alla comparsa di sintomi diffusi.				
		Prodotti rameici (*)			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Fusariosi (Fusarium spp.) Rizoctoniosi (Rhizoctonia spp) Verticilliosi Verticillium spp.	Interventi agronomici impiego di seme conciato				
FITOFAGI					
Tonchio (Callosobruchus chinensis)	impiegare seme non infestato				

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità