

Difesa Integrata di: Sorgho

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Carbone <i>Sphacelotheca sorghi</i>	Interventi agronomici -concimazioni equilibrate -ampie rotazioni				Si consiglia di utilizzare ibridi resistenti. Ammissa la concia del seme.
Marciume delle plantule e del mais (MDMV) <i>Fusarium, Pythium, ecc</i>	Interventi agronomici - evitare semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti				Si consiglia di utilizzare ibridi resistenti. Ammissa la concia del seme.
FITOFAGI Afidi dei cereali (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Sitobion avenae</i> , <i>Schizaphis graminum</i>)	Non sono previsti interventi specifici				
Elateridi <i>Agriotes spp</i>	Interventi agronomici Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali ripetute lungo la fila. Non è ammissa la geodisinfestazione				
Piralide <i>Ostrinia nubilalis</i>	Interventi agronomici Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per identificare l'inizio del volo. A trebbiatura avvenuta effettuare un'accurata sfibratura degli stocchi. Soglia di intervento Intervenire alla comparsa delle prime larve.	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki			
Nottue terricole <i>Agrotis spp</i>	Non sono ammessi interventi chimici				

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità