

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> nel corso della potatura asportare e bruciare i rami colpiti. <u>Interventi chimici:</u> intervenire ad inizio caduta foglie e nella fase di ingrossamento delle gemme.	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Cocciniglia di San José (<i>Comstockaspis pernicioso</i>)	- Per i trattamenti di fine inverno: intervenire se ci sono stati danni alla raccolta nell'anno precedente o se si è osservata la presenza dell'insetto sul legno di potatura o sulle piante. - A completamento della difesa anticoccidica, di fine inverno, - Intervenire preferibilmente contro le forme svernanti in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi.	Olio minerale		(*)	(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo
Afide Grigio (<i>Dysaphis pyri</i>)	Soglia trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite	Sulfoxaflor			
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	Soglia E' obbligatorio l'uso delle trappole a feromoni, in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nella fase di caduta petali Trattare al superamento della soglia indicativa di 2 adulti per trappola catturati in una o due settimane - Verificare su almeno 100 frutti a ha la presenza di fori iniziali di penetrazione e trattare al superamento della soglia dell'1% . Si consiglia l'applicazione del metodo della confusione sessuale Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale. Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo.	Confusione e Distrazione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Virus della granulosa			Trappole aziendali o reti di monitoraggio
Rodilegno rosso (<i>Cossus cossus</i>)	- In presenza di infestazione effettuare la cattura in massa dei maschi con non meno di 5-10 trappole/ha installate entro la prima metà di maggio. Uncinamento delle larve all'osservazione della rosura.	Catture massali con trappole a feromoni			
Rodilegno giallo (<i>Zeuzera pyrina</i>)	<u>Interventi biotecnologici:</u> - Si consiglia l'installazione delle trappole sessuali per catture di massa non meno di 5-10 trappole/ha entro la prima metà di maggio Uncinamento delle larve all'osservazione della rosura.	Catture massali con trappole a feromoni			
Agrilo (<i>Agrilus sinuatus</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> asportare e bruciare i rami infestati dalle larve				

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità