

Difesa Integrata di: Cavolo a Infiorescenza

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiore	Cavolo broccolo Cime di rapa	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME							
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - favorire il drenaggio del suolo, - allontanare le piante e le foglie infette, - distruggere i residui delle colture malate. - non adottare alte densità d'impianto	Prodotti rameici	X	X		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
		Metalaxil-M	X	X	2		
		(Azoxystrobin +		X	2*	3**	(*)Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno
		Difenconazolo)		X	2	3**	(**)Per colture con cicli superiori ai 120 giorni, con raccolta primaverile, al massimo 3 interventi.
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp. <i>Rizoctonia solani</i> , <i>Phoma lingam</i>)	Interventi agronomici: - arieggiare le serre e i tunnel; - effettuare ampie rotazioni, - eliminare le piante ammalate. - utilizzare varietà poco suscettibili; Interventi chimici: Intervenire durante le prime fasi vegetative.						
		<i>Trichoderma asperellum</i>	X	X			
		<i>Trichoderma harzianum</i>	X	X			
		<i>Coniothyrium minitans</i>	X	X	(*)		(*) Solo contro Sclerotinia
Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>)	Interventi agronomici: effettuare ampie rotazioni, non adottare alte densità d'impianto Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei sintomi	Prodotti rameici				(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
		Difenconazolo	X	x	2	3	Difenconazolo: max 3 interventi all'anno Per colture con
		Fluxapirad+Difenconazolo	X	X	2		cicli superiori ai 120 giorni, con raccolta primaverile, al
		(Boscalid +	X	X	3		
		Pyraclostrobin)	X	X			
		Azoxystrobin	X		2*	3*	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin. Per colture con cicli superiori ai 120 giorni, con raccolta primaverile, al massimo
		(Azoxystrobin+ Difenconazolo)		X	2	3	3 interventi.
Ruggine bianca (<i>Albugo candida</i>)	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	(*)				(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

DDI MOLISE 2020

Difesa Integrata di: Cavolo a Infiorescenza

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiore	Cavolo broccolo Cime di rapa	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Punteruoli (<i>Baris</i> spp.) <i>Ceuthorrhyncus</i> spp.							
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	<u>Interventi chimici</u> Trattare alla comparsa	Fosfato ferrico	X	X			Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità