

Controllo Integrato delle infestanti di: Fagiolino

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|----------------|---------------------------|--|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) Acido pelargonico | (1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Clomazone Pendimetalin | |
| Post emergenza | Graminacee | Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Ciclossidim Fluazifop-p-butile | |
| | Dicotiledoni | Imazamox Bentazone | |

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro non arboreo sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$, ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uso ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.