



BOLLETTINO FENOLOGICO

PHENOLOGICAL BULLETIN

3 agosto 2017
2017 August 3

**Documento realizzato dal CREA-AA
nell'ambito del Programma
Rete Rurale Nazionale**

Piano biennale 2017-18

Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
Ufficio DISR2

Dirigente: Paolo Ammassari

**Scheda Progetto CREA 5.3
AGROMETEORE**

Responsabile scientifico: M. Carmen Beltrano

A cura di:
Gabriele Cola, Giovanni Dal Monte, Chiara
Epifani, Luigi Mariani

Grafica di copertina: Roberta Ruberto, Mario
Cariello

IPHEN

Italian Phenological Network



BOLLETTINO FENOLOGICO

PHENOLOGICAL BULLETIN

3 agosto 2017 - 2017 August 3

Vitis vinifera L., Olea europaea L., Castanea sativa Miller

Elaborazioni eseguite su dati fenologici prodotti dalla rete di rilevatori volontari aderenti al progetto IPHEN e su dati meteo-climatologici della Banca dati agrometeorologica nazionale (BDAN) e della rete NOAA-GSOD.

The outputs hereafter presented are based on phenological data collected by the network of volunteer observers of IPHEN project and on meteo-climate data of the National Agro-Meteorological Database (BDAN) and of NOAA-GSOD network.

www.reterurale.it/fenologia

Attività finanziata nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, progetto AGROMETEORE

INDICE - INDEX

ANDAMENTO METEOROLOGICO - METEOROLOGICAL OVERVIEW.....	4
Commento - Overview.....	4
FENOLOGIA - PHENOLOGICAL OVERVIEW.....	8
Vite - Grapevine.....	8
Olivo - Olive.....	10
Castagno - Chestnut.....	11
PROSSIMA EMISSIONE - NEXT ISSUE.....	14

ANDAMENTO METEOROLOGICO - METEOROLOGICAL OVERVIEW

Commento svolto su dati RAN e NOAA-GSOD per il periodo 26 luglio - 1 Agosto e su normali climatiche NOAA-GSOD 1987-2016

Meteorological overview based on RAN and NOAA-GSOD data for the period July 26 - August 1 and on the climate normal 1987-2016

Commento - Overview

La carta settimanale del livello di pressione di 850 hPa mostra il Centro Europa interessato da robuste correnti occidentali che fluiscono fra l'Anticiclone delle Azzorre centrato sul vicino Atlantico a sud della Penisola Iberica e il Ciclone d'Islanda centrato a Nordovest della Scozia. Tali correnti influenzano il settentrione come mostra la curvatura ciclonica assunta dall'isopisa di 1515 hPa a valle dell'arco alpino.

Sull'Africa del Nordovest è inoltre presente un promontorio subtropicale secondario centrato sull'Algeria mentre una depressione insiste sull'Anatolia orientale. Fra queste ultime due strutture circolatorie si mantiene un regime di correnti da Nordovest su Ionio ed Egeo.

Venendo ad analizzare i singoli giorni, da mercoledì 26 a venerdì 28 sull'Italia si è mantenuto un flusso di correnti nordoccidentali che ha apportato masse d'aria più fresche ed instabili di origine nord-atlantica. Ne è conseguita attività temporalesca sparsa che ha interessato l'intera penisola.

Sabato 29 è transitata una debole perturbazione sul settentrione cui ha fatto seguito da Domenica 30 l'affermarsi di un promontorio anticiclonico da sudovest con tempo stabile e soleggiato sull'intera area italiana, salvo instabilità residua sui settori alpini e prealpini.

Le temperature si sono mantenute in prevalenza su valori prossimi alla norma salvo deboli o moderate anomalie a carattere locale sul centro-sud più evidenti nei massimi. Le precipitazioni sono apparse più significative sul settentrione con massimi sulla Lombardia centro-orientale. Da segnalare anche le piogge registrate nell'area dello stretto di Sicilia.

I dati alla base di questo commento provengono dalla Rete Agrometeorologica Nazionale del MiPAAF (www.cra-cma.it), dalla rete NOAA - GSOD (<https://data.noaa.gov/dataset/global-surface-summary-of-the-day-gsod>), dalle carte circolatorie della statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA (<http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/histdata/>) e dalla rete di monitoraggio fulmini (<http://it.blitzortung.org>).

Carte meteorologiche - Meteorological maps




Fig. 1 - Topografia media del livello di pressione di 850 hPa (in media 1.5 km di quota) per il periodo 26 Luglio - 1 Agosto. Le frecce inserite danno un'idea orientativa della direzione e del verso del flusso, di cui considerano la sola componente geostrofica. Gli assi delle saccature sono in blu e quelli dei promontori in rosso.

Mean topography of the pressure level of 850 hPa (about 1.5 km height) for the period July 26 - August 1. The red arrows give an approximate idea of the flux direction taking into account only the geostrophic component. If present, red lines represent the axes of anti-cyclonic ridges and blue lines represent the axes of troughs.




Fig. 2 - *Precipitazioni cumulate nel periodo in esame. Total precipitation for the analyzed period.*



Fig. 3 - *Anomalia della temperatura massima nel periodo in esame rispetto alla media 1993-2010. Anomaly of maximum temperature for the analyzed period with reference to the 1993-2010 mean values.*



Fig.4 - *Anomalia della temperatura minima nel periodo in esame rispetto alla media 1993-2010. Anomaly of minimum temperature for the analyzed period with reference to the 1993-2010 mean values*

Precipitazioni - periodo 26 Luglio - 1 Agosto




Fig. 5 - Diagramma latitudinale delle precipitazioni nel periodo in esame. Latitudinal diagram of precipitation for the analysed period

Temperature massime - anomalia - periodo 26 Luglio - 1 Agosto




Fig. 6 - Diagramma latitudinale delle anomalie delle temperature massime nel periodo in esame. Latitudinal diagram of anomaly of maximum temperature for the analysed period

Temperature minime - anomalia - periodo 26 Luglio - 1 Agosto




Fig. 7 - Diagramma latitudinale delle anomalie delle temperature minime nel periodo in esame. Latitudinal diagram of anomaly of minimum temperature for the analysed period

FENOLOGIA - PHENOLOGICAL OVERVIEW

Vite - Grapevine

Graduale avanzamento fenologico di entrambe le varietà (fig 8 e 9). Questa settimana sono giunte 9 osservazioni per Cabernet sauvignon e 8 per Chardonnay (fig.10).

CARTA DI ANALISI cv Cabernet sauvignon




Fig. 8 – Analisi fenologica stato attuale *Vitis vinifera* cv Cabernet sauvignon - fasi riproduttive. Phenological analysis – actual development of *Vitis vinifera* cv Cabernet sauvignon - reproductive stages.

CARTA DI ANALISI cv Chardonnay




Fig. 9 - Analisi fenologica stato attuale *Vitis vinifera* cv Chardonnay - fasi riproduttive. Phenological analysis - actual development of *Vitis vinifera* cv Chardonnay - reproductive stages

PUNTI OSSERVAZIONE cv Chardonnay e Cabernet sauvignon




Fig. 10 - Punti di osservazione per *Vitis vinifera* L. cv Cabernet sauvignon (punti rossi) e Chardonnay (quadrati blu). Observational sites for *Vitis vinifera* L. cv Cabernet sauvignon (red dots) and Chardonnay (blue squares).

Olivo - Olive

Da tutte le aree olivicole giungono segnalazioni del raggiungimento delle fasi avanzate di sviluppo delle drupe (fig. 11). Questa settimana sono pervenute 19 osservazioni (fig. 12).

CARTA DI ANALISI *Olea europaea*




Fig. 11 - Analisi fenologica stato attuale *Olea europaea* L.. Phenological analysis - actual development of *Olea europaea* L.

PUNTI OSSERVAZIONE *Olea europaea*




Fig. 12 - Punti di osservazione per *Olea europaea* L. (punti rossi). Observational sites for *Olea europaea* L. (red dots).

Castagno - Chestnut

Questa settimana possiamo pubblicare i dati di dieci siti sul territorio (fig. 13): ringraziamo come sempre i rilevatori che partecipano all'iniziativa.

In quasi tutti i siti monitorati, lo sviluppo dei frutti sta procedendo.

Purtroppo, a causa degli incendi sulle pendici del Vesuvio in Campania di metà luglio, abbiamo perso per questa campagna di monitoraggio, uno dei tre siti campani.

Vi ricordiamo che anche i dati di questa campagna saranno utilizzati per testare il modello previsionale necessario per la produzione di carte fenologiche di analisi e previsione della fioritura specifiche per questa specie, per questo motivo, i dati raccolti vengono presentati solamente sotto forma di tabella.

DATI OSSERVATI *Castanea sativa*

3 agosto 2017					
Codice stazione¹	Altitudine²	Pendenza³	Esposizione	Cultivar (se nota)	Stadio fenologico in BBCH (mediana dei valori associati alle piante osservate)
BG01	740	media	NE	Castagna della madonna; castagno selvatico; b. de betizac	71
BG02	767	alta	SO	Ostana, Cast. Selvatico, ibrido eurogiapponese, cast. tardivo	71
BZ01	550	media	SO	-	(dato non pervenuto)
CT08	615	media	-	-	(dato non pervenuto)
CZ01	900	nulla	NNO	-	75
CZ02	410	media	NNE	-	75
FI01	460	media	N	-	(dato non pervenuto)
FR02	600	nulla	SO	-	(dato non pervenuto)
NA02	470	alta	NO		71
NA04	500	alta	NNO		Sito di monitoraggio non più attivo
NA07	385	alta	NNO		71
RE05	850	bassa	SE	-	(dato non pervenuto)
RE06	735	media	E	-	(dato non pervenuto)
RM01	220	nulla	S	-	71
TN01	900	media	SO	Marroni di campi	79
TN02	650	media	E	Marroni di campi	79
TN03	850	bassa	NE	-	79
TV01	550	media	S	-	(dato non pervenuto)

(1) acronimo con sigla della provincia seguito da un codice numerico di due cifre;

(2) metri sul livello del mare;

(3) pendenza del versante (nulla-bassa 0-10% o 0-6°; media 10-40% o 6-22°; alta >40% o >22°)

PUNTI OSSERVAZIONE *Castanea sativa*




Fig. 13- Punti di osservazione per *Castanea sativa* Miller. Observational sites for *Castanea sativa* Miller.

IMMAGINI DELLE FASI FENOLOGICHE OSSERVATE *Castanea sativa*



BBCH71



BBCH71



BBCH79

Foto di: M. Bonanno (ISAFOM)

PROSSIMA EMISSIONE - NEXT ISSUE

Giovedì 10 agosto / Thursday August 10



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale