

SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

SECONDO AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DIFESA E DISERBO
AZIONE 214.1 DEL PSR 2007-2013 E REG. CE N. 1234/07
APRILE 2011

COLTURE FRUTTICOLE

| Coltura | Avversità | Prodotto da inserire o modificare | Limitazioni e Note |
|------------------|--|--|---|
| Albicocco | <i>Cydia molesta</i> e <i>Anarsia linatella</i> | Clorantraniliprole | Al massimo 2 trattamenti all'anno |
| | | Emamectina benzoato | Al massimo 2 trattamenti all'anno |
| Pesco | Tripide estivo | Acrinatrina | Contro questa avversità al massimo 1 intervento e comunque non più di 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui 1 in primavera e 1 nel periodo estivo |
| Susino | Anarsia lineatella Argyrotaenia pulchellana | Clorantraniliprole | Al massimo 2 trattamenti all'anno. |
| Nocciolo | Cimici | Etofenprox e Lamdacialotrina | Aggiungere nota: Tra Etofenprox e Lamdacialotrina non più di 3 interventi all'anno |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Vite da vino | Tignole | Confusione e disorientamento sessuale | |
| | Diserbo dicotiledoni | ELIMINARE : MCPA | <i>Eliminare in quanto non più ammesso su vite</i> |
| Ciliegio Pesco Nocciolo | Diserbo graminacee | Fluazifop-p-butile | <i>Inserimento dell'unico graminicida registrato per far fronte alla sospensione di glufosinate-ammonio e colpire l'intero spettro delle infestanti</i> (% s.a. 13,4) dose 2 l/ha all'anno (1 l/ha per ciascun trattamento) |
| Nocciolo, | Diserbo dicotiledoni e Spollonatura | Carfentrazone | <i>Innalzamento dose per far fronte alla sospensione di glufosinate-ammonio impiegato anche come spollonante.</i> (% s.a. 6,45) dose 2 l./ha all'anno. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 2 litri/ha all'anno. |
| Melo, Pero, Pesco e Albicocco IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI | Diserbo | Pendimetalin | (% s.a. 38,72) dose 2 l/ha |
| Vite, nocciolo, melo, pero, pesco, susino, kiwi IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI | Diserbo dicotiledoni | Carfentrazone | <i>Innalzamento dose per i giovani impianti in allevamento per far fronte alla sospensione di glufosinate-ammonio</i> (% s.a. 6,45). Al massimo 2 litri/ha all'anno |

COLTURE ORTICOLE

| Coltura | Avversità | Prodotto da inserire o modificare | Limitazioni e Note |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|
| Melone, pomodoro da industria e da mensa in pieno campo, melanzana, lattuga, peperone, cetriolo | Elateridi | Geodisinfestante: Zeta-Cipermetrina | Localizzato alla semina o al trapianto |
| Bietola da costa, Bietola rossa | Diserbo dicotiledoni | Metamitron | (% s.a. 50) 2 - 3 kg/ha in post-em |
| Spinacio | Diserbo dicotiledoni | Metamitron | (% s.a. 50) 2 - 3 kg/ha in pre-semina e post-em |

COLTURE ERBACEE

| Coltura | Avversità | Prodotto da inserire o modificare | Limitazioni e Note |
|--------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Mais | Piralide | Diflubenzuron | |
| | Elateridi | Geodisinfestante: Zeta-Cipermetrina | Localizzato alla semina |
| Barbabietola | Elateridi | Geodisinfestante: Zeta-Cipermetrina | Localizzato alla semina |