

DISERBO FRUMENTO DURO E ORZO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,40	1,5 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Dicotiledoni	Bifenox	40,8	2	
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	(Pyraflufen etile + Bifenox) (1) Diflufenican	(0,76 + 42,2) 42,0	1 - 1,3 0,3	(1) Su alcune cvs possono provocare leggera fitotossicità. Sull'apparato fogliare possono apparire ustioni puntiformi di carattere transitorio e senza riflesso alcuno su sviluppo e produttività. L'orzo è + soggetto.
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1)	35	0,2	(1) Solo in miscela con altri diserbanti di post emergenza, in terreni particolarmente infestati da papavero e cardo
		(Clodinafop-propargil+ Cloquintocet-Mexyl + Diflufenican) (1)	(5,5 + 1 + 3,77)	0,75	(1) Non ammesso su orzo
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr Diethyl) (1)	(16,8 + 1,00 + 8,00)	0,333	(1) Non ammesso su orzo
	Graminacee	(Fenoxaprop-p-etile+Mefenpir-dietile) (1)	(5,24 + 2,86)	0,7 – 1,5	(1) Non ammesso su orzo
		Tralkoxidim Pinoxaden + Cloquintocet-Mexyl Diclofop-metile	34,67 9,71 + 2,43 27,00	1,0 0,45 2 - 2,5	
		(Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl) (1)	22,3 + 5,60	0,25	(1) Non ammesso su orzo
		(Pinoxaden + Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(9,5 + 9,5 + 2,38)	0,2 - 0,25	(1) Non ammesso su orzo

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
Post emergenza	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile	75,0	0,050 - 0,080	(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
		Metsulfuron metile	20,0	0,015 - 0,020	
		Tribenuron-metile	50,0	0,020 - 0,030	
		Triasulfuron	20,0	0,037	
		Tritosulfuron (1)	71,4	0,05 - 0,07	
		(Tritosulfuron + Dicamba) (1)	25,0 + 50,0	0,12 - 0,20	
		Metil oleato + Metil palmitato (2)	37,5	0,50	
	Dicotiledoni con Galium e Graminacee	Clopiralid	9,5	0,8	(1) Non ammesso su orzo
		Dicamba	21,2	0,4 - 0,5	
		(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-etile+ Mefenpir-dietile) (1)	(0,79+6,32 + 2,37)	1,25	
		(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron + Mefenpir-dietile) (1)	(0,60 + 3 + 9)	0,50	
		Pyroxulam+Florasulam + Cloquitocet mexyl (1)	(7,08 + 1,42 + 7,08)	0,265	
	Dicotiledoni Con Galium	(Pinoxaden + Clodinafop-propargil + Florasulam + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(3,03 + 3,03 + 0,76 + 0,76)	0,67 - 1	(1) Non ammesso su orzo
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Amidosulfuron + Mefenpyr Diethyl) (1)	(14 + 0,83 + 6,00 + 6,70)	0,3 - 0,4	
		Florasulam	4,84	0,1 - 0,125	
		(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	(1,8 + 18,2 + 3,6)	4	
		Amidosulfuron	75	0,02 - 0,04	(1) Su alcune cvs possono provocare leggere fitotossicità
		Fluroxipyr	20,6	0,7 - 0,9	
		Dicamba	21,2	0,4 - 0,5	

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti