

DIFESA ERBA MEDICA

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
FITOFAGI			
Afidi dei cereali (<i>Rhopalosiphum padi</i>) (<i>Metopolophium dirhodum</i>)	CHIMICO: -Non sono previsti interventi specifici.		Nessun intervento chimico
Apion (<i>Apion pisi</i>)	CHIMICO: -In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sflalcio.	Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Deltametrina (1)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
Fitonoma (<i>Metopolosiphum dirhodum</i>) (<i>Sitobion avenae</i>) (<i>Hypera variabilis</i>) Tichio (<i>Tichius flavus</i>)	CHIMICO: -In caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura del primo sflalcio.	Lambdacialotrina (1) Deltametrina (1) (2) Cipermetrina (1) (2)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (2) Ammessa solo su <i>Hypera v.</i>
Lepidotteri defogliatori (<i>Nyssia Fiorentina</i>)	CHIMICO: -Non sono previsti interventi specifici.		Nessun intervento chimico
Nottue defogliatrici (<i>Spp.</i>)	CHIMICO: -In caso di elevata infestazione di larve.	Lambdacialotrina (1) Deltametrina (2)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento all'anno