

DIFESA AGRUMI

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
VIROSI			
CTV (<i>Citrus tristeza virus</i>)	AGRONOMICO: - impiegare materiale vivaistico certificato esente da CTV (<i>Citrus Tristeza Virus</i>) - effettuare controlli periodici; - eliminazione delle piante infette in ottemperanza alle prescrizioni previste nel D.M. 22/11/1996.		In applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria contro CTV, segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale l'eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio
BATTERIOSI:			
Piticchia batterica: (<i>Pseudomonas syringae</i>)	AGRONOMICO: - Adottare idonee misure di difesa dalle avversità climatiche, soprattutto vento (protezione degli agrumeti con frangivento). - Evitare concimazioni azotate eccessive - Favorire i processi di lignificazione dei germogli; - Accertarsi della presenza dell'avversità. CHIMICO: - Se necessario, intervenire agli inizi di novembre (ovvero autunno-inverno) eventualmente subito dopo eventi meteorici che favoriscono le infezioni (vento forte, abbassamenti termici e piogge prolungate).	Prodotti rameici;	
CRITTOGAME			
Marciumi radicali: (<i>Phytophthora spp.</i>)	AGRONOMICO: - Favorire il drenaggio, evitare gli eccessi idrici; - Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante. CHIMICO: - Intervenire in presenza di sintomatologia apparente. - Effettuare gli interventi dopo la ripresa vegetativa.	Prodotti rameici (1) Fosetil Al (2) (3) Metalaxil - M (4) (5)	Limitare gli interventi solo sulle piante con sintomi. (1) spennellature al tronco; (2) irrorazioni alla chioma; (3) ammesso su arancio, mandarino, limone e pompelmo. (4) distribuire sul terreno interessato dalla proiezione della chioma. (5) da utilizzare solo su arancio, mandarino e limone.
Allupatura (<i>Phytophthora spp.</i>)	AGRONOMICO: - Favorire il drenaggio; - Evitare gli eccessi idrici e promuovere l'inerbimento invernale. CHIMICO: - Negli agrumeti dove il marciume è ricorrente, o in annate piovose, fare i trattamenti all'invasiatura dei frutti nella parte bassa della chioma.	Prodotti rameici.	Interventi localizzati.

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Mal secco: <i>(Deuterophoma Tracheiphila)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di varietà resistenti; - Asportazione e bruciatura di piante infette comprese ceppaie; - Preferire non lavorazione, lavorazioni superficiali o inerbimento. CHIMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Intervenire solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite (vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo l'evento; - Interventi necessari soprattutto su limone. 	Prodotti rameici (1)	Isolare e distruggere le piante infette, comprese le radici. Informare le autorità competenti (1) Massimo 2 trattamenti per anno.
Cancri gommosi <i>(Botryosphaeria ribis ovvero Dothiorella ribis)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di materiale di propagazione sano; - Asportazione delle parti infette e disinfezione con i prodotti consentiti; - Asportazione e bruciatura delle parti infette. CHIMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Spennellature con prodotti rameici sul tronco e rami lignificati. 	Prodotti rameici (1)	Isolare le piante malate e informare le autorità competenti. (1) Spennellature sul tronco e sulle branche ben lignificate;
Fumaggine <i>(Capnodium citri ecc.)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare potature che assicurino una buona aerazione della chioma; - Evitare eccessive concimazioni azotate; - Assicurare il controllo dei fitofagi che producono melata (cocciniglie). 		In genere il corretto contenimento dei fitofagi che producono melata è sufficiente a prevenire la fumaggine.
Gommosi del colletto <i>(Phytophthora citrophthora.)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Evitare la bagnatura del colletto e/o la persistenza dell'umidità; - Effettuare la scalzatura del colletto; - Asportazione e bruciatura delle piante infette; - Uso di portinnesti resistenti; - All'impianto mettere le piante a dimora a profondità non eccessiva; - Evitare irrigazioni eccessive; - Assicurare un buon drenaggio del terreno; CHIMICO: <ul style="list-style-type: none"> - spennellature al colletto e alla base del tronco con prodotti autorizzati 	Prodotti rameici (1); Propamocarb (2) (3) (7) Fosetil Al (2) (3) (4) Metalaxil – M (5) (6)	Attuare gli interventi agronomici. (1) pulitura delle parti infette e spennellature al tronco; (2) intervenire con accertata sintomatologia; (3) trattamenti localizzati; (4) ammesso su arancio, mandarino, limone e pompelmo. (5) Ammesso su arancio limone e mandarino (6) Distribuzione localizzata al terreno interessato dalla proiezione della chioma (7) Non ammessa su arancio

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
FITOFAGI			
Afidi <i>(Aphis spiraecola - citricola: afide verde)</i> <i>(Aphis gossypii a. del cotone)</i> <i>(Toxoptera aurantii)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Consentire con la potatura una buona aerazione della chioma; - Evitare eccessive concimazioni azotate. BIOLOGICO: <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia dei predatori e parassitoidi già presenti; CHIMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali, prima di programmare l'eventuale trattamento chimico; - E' consigliabile intervenire in maniera localizzata sui focolai. - Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'aphis citricola e del 25% per le altre specie; 	Azadiractina (1) Fluvalinate (2) (3) (7) Imidacloprid (4) (5) Acetamiprid (4) Thiamethoxam (4) (5) Spirotetramat (6)	(1) Solo su arancio, mandarino, limone e pompelmo; (2) 1 trattamento/anno sull'avversità (3) Solo su arancio e mandarino (4) Al massimo 1 intervento all'anno con i neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità (5) Solo su arancio, clementine, limone e mandarino (6) Al massimo 2 interventi all'anno (7) Tra Piretroidi ed Etofenprox al massimo tre interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
Cotonello degli agrumi <i>(Planococcus citri)</i>	AGRONOMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Eseguire potature che assicurino una buona aerazione della chioma; - Evitare eccessive concimazioni azotate. BIOLOGICO: <ul style="list-style-type: none"> - Usare le trappole a ferormoni per il monitoraggio dei voli; - Monitorare la presenza del fitofago su rami e frutti, da maggio in poi; - Introdurre <i>Leptomastix dactilopii</i> in presenza del fitofago, quando la temperatura ambiente media raggiunge i 18 °C; - Lanci del predatore <i>Criptolaemus mountrouzieri</i>, in presenza del fitofago; - Controllo della presenza di formiche che ostacolano l'azione dei predatori (coccinellidi); BIOTECNICO: <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare prodotti collanti (su apposite fascette) da posizionarsi alla base del tronco (contro le formiche). CHIMICO: <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di p.a. granulari sui formicai e/o alla base del tronco; - Esaminare 10 frutti/albero sul 5% delle piante; intervenire sulle piante solo al superamento della soglia di intervento nei frutti infestati: 5% (estate); 10 – 15 % (autunno); - Interventi sulle formiche. 	<i>Leptomastix dactilopii</i> <i>Criptolaemus mountrouzieri</i> Olio minerale Clorpirifos (1) (2) (3) Spirotetramat (4)	Rispettare le soglie di intervento indicate (1) Con lanci di parassitoidi o predatori il trattamento non è consentito; (2) Intervento sui formicai, con accertata biocenosi cocciniglia-formica con una dose massimo di 500 l/ha e avendo cura di non bagnare la chioma; (3) Massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Aleurodidi (<i>Aleurothrixus floccosus</i>) (<i>Dialeurodes citri</i>)	AGRONOMICO: - Eseguire potature che assicurino una buona aerazione della chioma; - Evitare eccessive concimazioni azotate. BIOLOGICO: - Lanci di parassitoidi; CHIMICO: - Parassitizzazione da <i>Encarsia lahorensis</i> : effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal 10% delle piante e verificarne il tasso di parassitizzazione. - Interventi da effettuare solo livelli di parassitizzazione inferiore al 5%; - Intervenire al superamento della soglia di intervento (1 neanide per cmq, controllo su 5 – 10 foglie per il clementine, 20 – 25 per gli altri agrumi).	<i>Cales noacki</i> (per <i>A. floccosus</i>) <i>Encarsia lahorensis</i> (per <i>D. citri</i>) <i>Amitus spiniferus</i> (per <i>A. floccosus</i>) Olio minerale Spirotetramat (1) (2)	(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Ammesso solo su <i>Aleurothrixus f.</i>
Cimicetta verde (<i>Calocoris trivialis</i>)	AGRONOMICO: - Interventi di potatura (che incida anche sull'la fioritura) che tendano a riequilibrare l'alternanza produttiva tra le annate di "scarica" e "carica" dei frutti. CHIMICO: - Intervenire al raggiungimento della soglia: Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20% di germogli infestati.	Etofenprox (1)	Contro quest'avversità al massimo 1 intervento all'anno (1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al massimo tre interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
Minatrice serpentina : (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	AGRONOMICO: - Evitare stress idrici e adacquamenti eccessivi; - Ridurre gli apporti azotati estivi a favore di quelli primaverili; - Evitare drastiche potature di formazione o le potature di riforma e anticipare quelle di allevamento; - Assicurarsi forniture vivaistiche non infestate e controllate; - Proteggere con reti antinsetto o con T.N.T. le piantine nei primi anni d'impianto. CHIMICO: - Solo su giovani impianti e reinnesti, in coincidenza dei flussi vegetativi e al raggiungimento della soglia di intervento del 30% dei germogli infestati	Olio minerale (1) Imidacloprid (2) (3) Acetamiprid (2) (3) Flufenoxuron (2) (4) (5) (10) Tebufenozide (2) (4) (10) Abamectina (6) (10) Azadiractina (6) Metossifenozone (7)(10) Clorantraniliprole (6)(8)(9)	(1) Alla dose di 0,5 kg/hl di sostanza attiva; utile anche come sinergizzante delle altre sostanze attive indicate. (2) Trattamenti ammessi solo su giovani impianti (fino al 5° anno) o reinnesti. (3) Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità (4) Massimo 1 intervento indipendentemente dall'avversità; (5) Autorizzato solo su arancio, limone e clementine; (6) Autorizzato solo su arancio limone e mandarino; (7) Autorizzato solo su arancio, clementine e mandarino (8) Solo su impianti non in produzione (9) Al massimo 2 interventi l'anno (10) Al massimo 3 interventi all'anno con questi prodotti in alternativa tra di loro
Cocciniglia mezzo grano di pepe: (<i>Saissetia oleae</i>) Ceroplastes (<i>Ceroplastes rusci e sinensis</i>)	AGRONOMICO: - Eseguire potature che assicurino una buona aerazione della chioma. BIOLOGICO: - Salvaguardia dei predatori e parassitoidi naturali. CHIMICO: - Intervenire in caso di scarsa attività di contenimento dei parassitoidi <i>Metaphycus spp.</i> e <i>Scutellista cyanea</i> (verificabile dalla presenza di fori di sfarfallamento presenti nelle esuvie); - Intervenire in presenza di neanidi di 1^ e 2^ età, in prima e seconda generazione, al superamento della soglia di 4 neanidi/foglia rilevato su un campione di 100 foglie.	Olio minerale (1) Fosmet (2) Spirotetramat (3) (4)	(1) Effettuare trattamenti localizzati (2) Massimo 2 trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Non Ammessa su <i>Ceroplastes sinensis</i>

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Cocciniglia rossa forte: <i>(Aonidiella aurantii)</i> Altri diaspinidi: <i>(Chrysonphalus dictyospermi,</i> <i>Mytilococcus beckii)</i>	AGRONOMICO: - Evitare drastiche potature di formazione o le potature di riforma e anticipare quelle di allevamento; - Eliminare con la potatura le parti attaccate. BIOLOGICO: - Salvaguardia di predatori e parassitoidi naturali; - Lanci di Aphytis melinus. Si consiglia di utilizzare da 50.000 a 200.000 individui/ha, non superando comunque un massimo per lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della quantità totale in primavera su tutta la superficie con una cadenza quindicinale (iniziando alle prime catture di maschi svernanti e interrompendo alla fine delle catture degli stessi). Il restante 50% va lanciato concentrando i lanci sui focolai della cocciniglia rossa forte. E' utile effettuare lanci anche dopo il verificarsi di condizioni sfavorevoli per l'entomofauna utile (gelate, elevate temperature, trattamenti chimici non selettivi). CHIMICO: - Monitoraggio dei voli tramite trappole a feromoni; - Si consiglia di collocare trappole al feromone in ragione di 3 per appezzamento; - Interventi ammessi al superamento della soglia di 1 femmina per cm di rametto su un campione di 4 rametti da 10 cm ciascuno prelevati sul 5% delle piante e/o in presenza di un 10 % di frutti infestati in agosto (20 % in settembre); - Verificata la soglia di intervento effettuare il trattamento 7 – 10 giorni dopo il picco delle catture dei maschi sulle trappole; - Intervenire nel periodo di massima fuoriuscita delle neanidi;	<i>Aphis melinus;</i> Polisolfuro di calcio Olio minerale Clorpirifos metile (1) (2) Clorpirifos (1) (2) Piriproxifen (3) Spirotetramat (4) (5)	Rispettare le soglie di intervento indicate (1) Con lanci di parassitoidi o predatori il trattamento non è consentito; (2) Con queste sostanze attive, al massimo 1 intervento all'anno, in alternativa tra di loro (3) Massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (5) Non Ammessa su altri diaspinidi
Tignola della zagara <i>(Prays citri)</i>	AGRONOMICO: - Nel limone, anticipare di circa 20 giorni l'interruzione della secca per la produzione dei verdelli. BIOLOGICO: - Intervenire con il B. Thuringiensis al superamento della soglia di intervento (20% di fiori attaccati). CHIMICO: - Intervenire solo in caso di accertata presenza del fitofago.	<i>Bacillus Thuringiensis (1)</i> Fosmet (2)	(1) Massimo due interventi, è ammessa l'aggiunta di zucchero alla soluzione; (2) Solo su limone, 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
Mosca della frutta <i>(Ceratitis capitata)</i>	AGRONOMICO: - Eliminare tutti i frutti da terra dopo la raccolta. CHIMICO: - Intervenire con esche proteiche avvelenate da metà luglio e ripetere l'intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di un filare ogni 2 - 3 filari, utilizzando massimo 400 l/ha di soluzione; - Posizionamento di trappole attivate pronte all'uso; - Intervenire a tutta chioma al superamento della soglia di intervento di 20 adulti/trappola/settimana e/o alle prime punture sui frutti.	(Esche proteiche + Etofenprox o Fosmet) Trappole attivate pronte all'uso (6) (7) (8) Etofenprox (1) (5) Fosmet (1) Alfamestrina (1) (5) Lambdacialotrina (1) (5) Spinosad (2) (3) (4)	Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti superiori a 2 ha. (1) Sono ammessi massimo 2 interventi l'anno a tutta chioma indipendentemente dal principio attivo utilizzato; (2) Solo prodotti specifici formulati con sostanze attrattive (3) Da preferire un utilizzo in strategie di difesa a livello comprensoriale (4) Sono ammessi al massimo 5 interventi all'anno (5) Tra Piretroidi ed Etofenprox al massimo tre interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità (6) Attivate con esca in gel contenente Lufenuron (7) Non ammessa su Pompelmo (8) Le trappole pronte all'uso, sono quelle in cui la s.a. non entra in contatto con la vegetazione.

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Tripidi: (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	AGRONOMICO: - Equilibrare potature e concimazioni azotate; - evitare gli stress idrici. CHIMICO: - Intervenire al superamento della soglia di intervento di 5 - 10% di foglie infestate (campione di 4 germogli per pianta) ed il 5% (10% limone) sui frutticini infestati (campione di 20 frutti per pianta); - Periodo utile per la campionatura: dalla caduta petali fino al raggiungimento del diametro di circa 3 cm.	Acrinatrina (1) Azadiractina (1) (2)	(1) Contro questa avversità massimo 1 trattamento l'anno. (2) Utilizzabile solo su: arancio, limone, mandarino e pompelmo.
ACARI			
Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>Pannonicus citrii</i>)	AGRONOMICO: - Equilibrare potature e concimazioni azotate; - Evitare gli stress idrici. CHIMICO: - L'uso degli oli bianchi contro le cocciniglie riesce a contenere anche le popolazioni di acari. - Intervenire al superamento delle soglie: - Tetranychus urticae: 10% di foglie occupate da forme mobili e 2 % di frutti infestati; Pannonicus citri: 30% di foglie infestate e/o 3 acari/foglia.	Olio minerale Abamectina Clofentezine Etoxazole Exitiazox Tebufenpirad Pyridaben Fenazaquin (1)	È consentito un solo trattamento annuale contro questa avversità. Lo zolfo eventualmente utilizzato contro altre avversità ha una efficacia nel limitare le infestazioni dei ragnetti (1) Commercializzazione di formulati a base di Fenazaquin consentita fino al 30 luglio 2012; impiego consentito fino al 30 novembre 2012
Eriofidi e Tarsonemidi (<i>Eriophyes sheldoni</i>) (<i>Aculops pelekassi</i>) (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	AGRONOMICO: - Equilibrare potature e concimazioni azotate; - Evitare gli stress idrici. CHIMICO: - L'uso degli oli bianchi contro le cocciniglie riesce a contenere anche le popolazioni di acari; - Intervenire al superamento della soglia del 30% delle gemme infestate per Eriophyes sheldoni; alla presenza di frutti infestati per Polyphagotarsonemus latus; Aculops pelekassi.	Olio minerale	Su Eriophyes sheldoni si consiglia di intervenire in periodi di sviluppo vegetativo assente, entro dicembre.
ALTRE AVVERSITA'			
Limacce (<i>Spp.</i>)	BIOLOGICO: - Interventi sul terreno.	Ortofosfato di ferro	

FITOREGOLATORI AGRUMI

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
Allegante	Acido giberellico (1)	(1) da usare su clementine e mandarino
Aumento pezzatura frutti	Triclopir	