



MODIFICHE ALLE NORME COLTURALI PER LA VALLE D'AOSTA ANNO 2013

DIFESA

Coltura	Avversità	Prodotti da inserire	Prodotti da eliminare	Limitazioni
Melo, pero e vite	Varie		Fenazaquin	
Melo e pero	Varie		Bitertanolo	
Melo e pero	Cocciniglia		Polisolfuro di Ca	Eliminare come insetticida
Melo e pero	Cocciniglia	Buprofezin		
Melo e pero	Afide grigio, afide verde,	Sali potassici di acidi grassi		
Melo e pero	Ragnetto rosso	Acechinocil		Con le limitazioni degli acaricidi
Melo e vite	Oidio	Ciflufenamide		Al massimo 2 interventi all'anno
Melo e vite	Dove previsto		Flufenoxuron	
Melo	Eriofide	Abamectina		Massimo 1 intervento all'anno
Pero	Maculatura bruna	Tiram		Nei frutteti colpiti e sulle varietà sensibili al massimo 4 tiram fino a 40 giorni dalla raccolta.
Pero	Maculatura bruna	Fluazinam		Al massimo 3 interventi all'anno
Vite	Peronospora	Ametoctradin+metiram		Al massimo 3 all'anno nei limiti dei ditiocarbammasti
Vite	Oidio	Pyraclostrobin		Al massimo 3 volte all'anno nei limiti delle strobilurine
Vite	Muffa grigia o botrite e marciume acido	Bacillus amyloliquefaciens		
Vite	Muffa grigia o botrite	Fenpyrazamide		Impiegabile una volta all'anno
Vite	Muffa grigia o botrite	Fluopyram		Impiegabile una volta all'anno in alternativa al boscalid
Vite	Tignola, tignoletta e scafoideo	Clorpirifos etil e Clorpirifos metil		1 estere fosforico per anno, 2 solo per il contenimento dello scafoideo entro fine luglio
Vite	Cicaline (Empoasca, scafoideo)	Sali potassici di acidi grassi		
Vite	Cicaline	Buprofezin		



	(Empoasca, scafoideo)			
Vite	Cocciniglie	Clorpirifos metil		1 estere fosforico per anno, 2 solo per il contenimento dello scafoideo entro fine

DISERBO

Melo, pero e vite	Diserbo	Pyraflufen-ethyle		prodotti al 2,6% di p.a. da usare in alternativa al carfentrazone alla dose di 0,8 l/ha per trattamento, con un limite di 1,6 l/ha per anno
-------------------------	---------	-------------------	--	---