

ALLEGATO 1

| PAG. | COLTURA | AVVERSITA' | SOSTANZA ATTIVA DA INSERIRE | LIMITAZIONI E NOTE |
|------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 24 | Vite da tavola | Ragnetto rosso | Formetanate | Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità |
| 37 | Cotogno | Ticchiolatura | Captano+Fosfonato di potassio | |
| 43 | Ciliegio | Monilia | Bicarbonato di potassio | |
| 43 | Ciliegio | Afide nero | Beauveria bassiana | |
| 73 | Agrumi | Acari | Beauveria bassiana | Al massimo un intervento all'anno contro l'avversità. Autorizzato solo su Panonychus spp. e Tetranychus spp. |
| 77 | Albicocco | Afidi | Beauveria bassiana | Autorizzato solo su Myzus persicae. |
| 80 | Fragola | Oidio | Cos-Oga | Solo in coltura protetta |
| 83 | Fragola | Ragnetto rosso, ragnetto giallo | Cyflumetofen | Solo in coltura protetta |
| 96 | Pero | Maculatura bruna | Difenoconazolo | Tra difenoconazolo, tebuconazolo, miclobutanil al massimo 1 intervento all'anno. Sostanze in alternativa tra loro |
| 96 | Pero | Maculatura bruna | Bicarbonato di potassio | |
| 97 | Pero | Cacopsylla pyri | Beauveria bassiana | |
| 105 | Pesco | Afidi | Beauveria bassiana | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------------------------|--|
| 111 | Susino | Monilia | Bicarbonato di potassio | |
| 112 | Susino | Mosca della frutta | Beauveria bassiana | |
| 113 | Susino | Tripidi | Beauveria bassiana | |
| 120 | Carciofo | Peronospora | Mandipropamide | Al massimo 2 interventi all'anno |
| 124 | Carota | Oidio | Bicarbonato di potassio | |
| 126 | Cavoli a infiorescenza | Peronospora | Mandipropamide | 1) Al massimo 2 interventi all'anno 2) Solo su cavolfiore e cavolo broccolo |
| 134 | Cavolo rapa | Ruggine | Olio di arancio dolce | |
| 136 | Cavoli a foglia | Tripidi | Olio di arancio dolce | |
| 138 | Ravanello | Peronospora brassicae | Mandipropamide | Al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale |
| 141 | Cetriolo | Oidio | Cos-Oga | |
| 144 | Cetriolo | Aleirodidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 150 | Zucchini | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 151 | Zucchini pieno campo e coltura protetta | Nematodi | Azadiractina | |
| 153 | Zucca | Oidio | Cos-Oga | |
| 157 | Cicerchia | Afidi | Tau-fluvalinate | Al massimo 2 interventi all'anno |

| | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---------------------------|--|
| 159 | Fagiolino | Afidi | Tau-fluvalinate | Tra piretroidi ed etofenprox al massimo tre interventi per ciclo colturale |
| 160 | Fagiolino | Piralide | Tau-fluvalinate | Tra piretroidi ed etofenprox al massimo tre interventi per ciclo colturale |
| 161 | Fagiolino | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 161 | Fagiolino | Tripidi | Tau-fluvalinate | Tra piretroidi ed etofenprox al massimo tre interventi per ciclo colturale |
| 166 | Finocchio | Oidio ed Alternaria | Bicarbonato di potassio | |
| 184 | Melanzana | Oidio | Cos-Oga | Eliminare nota 9 |
| 187 | Melanzana | Aleirodidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 188 | Melanzana | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 194 | Melone | Aleroididi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 195 | Melone | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 199 | Cocomero | Oidio | Cos-Oga | |
| 211 | Peperone | Oidio | Cos-Oga | Eliminare la nota solo in coltura protetta. |
| 215 | Peperone | Aleroididi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 216 | Peperone | Nematodi | Azadiractina | Impiego per fertirrigazione |
| 216 | Peperone | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 227 | Pomodoro in coltura protetta | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | |
| 228 | Pomodoro in coltura protetta | Nematodi | Azadiractina | Impiego per fertirrigazione |
| 242 | Fava | Afidi | Tau-fluvalinate | Al massimo 2 interventi all'anno |
| 243 | Prezzemolo | Mal bianco ed Alternariosi | Bicarbonato di potassio | |
| 250 | Sedano | Alternariosi | Bicarbonato di potassio | |
| 251 | Sedano | Oidio | Bicarbonato di potassio | |
| 257 | Officinali | Oidio ed Alternaria | Bicarbonato di potassio | |
| 259 | Lattuga e lattughino baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 265 | Dolcetta baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 270 | Cicorino baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 275 | Foglie e steli di brassica baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 278 | Bietola da foglie baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 281 | Spinacino baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--------------------------------------|---|
| 284 | Rucola baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 290 | Barbarea baby leaf in coltura protetta | Peronospora | Cos-Oga | |
| 298 | Pomodoro in pieno campo | Oidio | Cos-Oga | |
| 301 | Pomodoro in pieno campo | Tripidi | Olio essenziale di arancio dolce | |
| 303 | Pomodoro in pieno campo | Nematodi | Azadiractina | Impiego per fertirrigazione |
| 309 | Frumento | Ruggini | Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin | Interventi con fungicidi chimici in numero di 2 indipendentemente dall'avversità. Sono ammesse al massimo 2 s.a. candidate alla sostituzione indipendente dall'avversità. |
| 310 | Frumento | Septoriosi | Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin | Interventi con fungicidi chimici in numero di 2 indipendentemente dall'avversità. Sono ammesse al massimo 2 s.a. candidate alla sostituzione indipendente dall'avversità. |
| 322 | Floreali e ornamentali | Tripidi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 323 | Floreali e ornamentali | Aleirodi | Paecilomyces fumosoroseus | Solo in coltura protetta |
| 326 | Floreali e ornamentali | Punteruoli | Beauveria bassiana | |
| 326 | Floreali e ornamentali | Punteruoli | Abamectina | Solo su Punteruolo rosso delle palme. Trattamento per endoterapia |
| 340 | Basilico | Diserbo | Benfluralin | Pre-semina ; dicotiledoni |
| 349 | Indivia riccia | Diserbo | Benfluralin | Solo in pieno campo |
| 350 | Indivia scarola | Diserbo | Benfluralin | Solo in pieno campo |
| 354 | Prezzemolo | Diserbo | Benfluralin | Pre-semina; dicotiledoni |
| 356 | Officinali (salvia, rosmarino ecc.) | Diserbo | Benfluralin | Pre-semina; dicotiledoni |
| 359 | Tabacco | Diserbo | Benfluralin | Eliminare |

| | | | | |
|-----|--|---------|-------------|---------------------|
| 369 | Radicchio | Diserbo | Benfluralin | Solo in pieno campo |
| 369 | Cicoria | Diserbo | Benfluralin | Solo in pieno campo |
| 374 | Dolcetta | Diserbo | Benfluralin | Solo in pieno campo |
| 374 | Steli e germogli di Brassica in coltura protetta | Diserbo | Benfluralin | Eliminare |
| 374 | Lattuga e lattughino in coltura protetta | Diserbo | Benfluralin | Eliminare |
| 375 | Rucola in coltura protetta | Diserbo | Benfluralin | Eliminare |
| 375 | Crescione | Diserbo | Benfluralin | Eliminare |