

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE AD UVA DA VINO 2011

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - Durante la potatura asportare le parti infette; - Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, ma raccogliarli e bruciarli; <u>Interventi chimici:</u> Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: - inizio del germogliamento; - dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.	Zolfo ramato Mancozeb(1) Metiram(1) Pyraclostrobin(2)	Massimo 2 interventi all'anno contro questa aversità (1) I ditiocarbammati e Ditanon sono impiegabili al max fino all'allegagione indipendentemente dall'avversità (2) Prodotti in alternativa fra loro per un massimo di 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	- Fino alla fioritura: eseguire o un trattamento cautelativo con fungicidi a lunga persistenza oppure attendere una pioggia infettante per poi intervenire, entro 2-3 giorni con miscele contenenti endoterapici . - Post- fioritura mantenere la vegetazione protetta con prodotti di copertura soli o miscelati con preparati endoterapici.	Prodotti rameici Cimoxanil(1) Fosetil di alluminio Famoxadone(2) Fenamidone(2) Pyraclostrobin(2) Dimetomorf(3) Iprovalicarb (3) Mandipropamide (3) Cyazofamid(4) Ditianon (5) Metiram (5) Mancozeb(5) Benalaxil(6) Benalaxil M(6) Metalaxil M(6) Metalaxil (6) Zoxamide(7) Fluopicolide(8)	(1) Massimo 4 interventi all'anno (2) Prodotti in alternativa fra loro per un massimo di 3 interventi all'anno indipendentemente d'allaversità (3) Massimo 3 interventi all'anno. Comunque non più di 4 CAA per anno. (4) Massimo 3 interventi all'anno. (5) I ditiocarbammati e Ditanon sono impiegabili al max fino all'allegagione indipendentemente dall'avversità (6) Fenilammidi al massimo 3 interventi all'anno in alternativa tra loro. (7) Massimo 3 interventi all'anno. (8) Massimo 3 interventi all'anno.
Oidio (<i>Uncinula necator- Oidium tuckeri</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - Zone ad alto rischio: dal germogliamento alla prefioritura, intervenire preventivamente con antioidici di copertura. Dalla prefioritura intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura Nelle fase di prechiusura grappolo sono da preferire le applicazioni con zolfo polverulento. Per evitare inconvenienti nella vinificazione limitare l'uso dello Zolfo con particolare riguardo all'ultimo periodo (dopo l'invaiaura)	Ampelomyces quisqualis Zolfo Quinoxifen (1) Spiroximina (1) IBE in nota (2) Pyraclostrobin(3)+Metiram(5) Tryfloxystrobin (3) Azoxistrobin(3) Boscalid (4) Bupirimate (6) Metrafenone (7) Meptildinocap (8)	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Massimo 3 interventi all'anno con IBE (3) Prodotti in alternativa fra loro per un massimo di 3 interventi all'anno indipendentemente d'allaversità (4) Massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (5) I ditiocarbammati sono impiegabili al max fino all'allegagione indipendentemente dall'avversità (6) Massimo 3 interventi all'anno (7) Massimo 3 interventi all'anno (8) Al massimo 2 interventi all'anno
Muffa grigia o Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - scelta di idonei vitigni e sistemi di allevamento - evitare qualsiasi tipo di forzatura - adottare concimazioni equilibrate - potatura verde eseguita razionalmente <u>Interventi chimici:</u> nei vigneti ad alto rischio sono consigliati due interventi preventivi: in prechiusura grappolo e 3-4 settimane prima della vendemmia. Nei vigneti a basso rischio si consiglia di intervenire solo se l'andamento climatico è molto favorevole allo sviluppo della malattia.	Pyrimetanil(1) Mepanpyrim(1) Fenexamid(2) Cyprodinil+fludioxonil(3) Boscalid (4)	Al massimo 2 interventi contro questa aversità (1) impiegabile una volta all'anno e in alternativa tra loro (2) impiegabile massimo una volta all'anno (3) Massimo 2 interventi all'anno (4) Massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Mal dell'esca (<i>Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e Fomitiporia mediterranea</i>)	<u>Interventi agronomici</u> In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle stesse.In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di taglio. Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno disinfettate. Ritardare le operazioni di potatura secca.		La disinfezione degli attrezzi può essere effettuata con ipoclorito di sodio.
Marciume degli acini (<i>Penicillium</i> spp. <i>Aspergillus</i> spp.)	<u>Interventi agronomici</u> - Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l'oidio, la tignoletta, ecc. - evitare qualsiasi tipo di forzatura - adottare concimazioni equilibrate	Cyprodinil + Fludioxonil (1)	(1) Tra Mepanpirim, Pyrimetalin e (Cyprodinil + Fludioxonil) al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

NOTA:
IBE ammessi: Ciproconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Triadimenol, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Fenbuconazolo, Propiconazolo

Derivati del rame: Idrossido di Cu, Ossicloruro di Cu, Poltiglia bordolese.

FITOFAGI			
<p>Tignoletta dell'uva (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Tignola dell'uva (<i>Clysia ambiguella</i>)</p>	<p>Non sono ammessi trattamenti contro la prima generazione.</p> <p><u>Per le generazioni successive :</u></p> <p><u>Soglie:</u></p> <p>- 2° generazione :</p> <p>a) vigneti solitamente infestati: presenza di uova o di fori di penetrazione.</p> <p>b) vigneti solitamente non infestati: 5% di grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di penetrazione.</p> <p>Il momento più opportuno per l'intervento è indicato dai comunicati del Servizio fitosanitario regionale.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>Tebufenozide(1)</p> <p>Teflubenzuron(1)</p> <p>Metossifenozide(1)</p> <p>Indoxacarb(1)</p> <p>Clorpirifos-etil(1)(3)</p> <p>Clorpirifos-metil(1)(3)</p> <p>Spinosad (2)</p> <p>Flufenoxuron (4)</p> <p>Emamectina (4)</p> <p>Clorantliniprole (5)</p>	<p>Al massimo due interventi all'anno con prodotti chimici.</p> <p>- L'impiego del <i>B.thuringiensis</i> richiede la massima tempestività (uova con testa nera o semischiusura uova) e accuratezza di esecuzione.</p> <p>E' raccomandabile aggiungere al <i>B. thuringiensis</i> 500 g/hl di zucchero.</p> <p>In caso di piogge è facilmente dilavabile e necessita rifare l'intervento.</p> <p>- Con andamento stagionale normale l'epoca del primo o dell'unico intervento cade tra il 9° e il 13° giorno dall'inizi o della fase crescente delle catture.</p> <p>(1) Massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Massimo 2 Esteri fosforici x anno Indipendentemente dall'avversità</p> <p>(4) Massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(5) Massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Cicaline (<i>Empoasca vitis</i>, <i>Zygina rhamni</i>)</p>	<p>Si consiglia di intervenire in caso di forte infestazione (almeno 1 forma mobile per foglia).</p>	<p>Thiamethoxam(1)</p> <p>Flufenoxuron(2)</p>	<p>Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno</p> <p>(1) Massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
<p>Scafoideo (<i>Scaphoideus titanus</i>)</p>	<p>Nelle aree delimitate dai Servizi Fitosanitari (in base a quanto stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti .</p> <p>In caso di presenza ammessi al massimo due interventi anche nelle altre zone.</p> <p><u>Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura):</u></p> <p>Con Buprofezin Thiamethoxam e Flufenoxuron intervenire tra la I e III età</p> <p>Con esteri fosforici intervenire in III-IV età (circa 35 giorni dopo la schiusura delle uova)</p> <p><u>Secondo intervento:</u></p> <p>Intervenire con un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e della persistenza del prodotto impiegato precedentemente.</p> <p>Porre attenzione al rispetto delle api.</p>	<p>Etofenprox(1)</p> <p>Clorpirifos-etil(1)(3)</p> <p>Clorpirifos-metil(1)(3)</p> <p>Thiamethoxam(1)(2)</p> <p>Flufenoxuron(4)(2)</p>	<p>Al massimo 2 interventi contro questa avversità</p> <p>(1) Massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Consigliato sulle forme giovanili</p> <p>(3) Massimo 2 Esteri fosforici x anno Indipendentemente dall'avversità</p> <p>(4) Massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>Clorpirifos-etile autorizzate anche formulazioni Xn</p>

FITOFAGI OCCASIONALI			
<p>Nottue (<i>Noctua spp.</i>)</p>	<p>Intervenire solo dopo aver accertato i primi danni nella fase di germogliamento</p>	<p>Deltametrina</p> <p>Ciflutrin</p>	<p>Al massimo 1 intervento chimico contro questa avversità</p> <p>Si consiglia la raccolta manuale.</p>
<p>Tripide (<i>Drepanothrips reuteri</i>)</p>	<p>Eseguire rilevamenti ad inizio vegetazione e intervenire solo nel caso di forti infestazioni che blocchino il germogliamento</p>	<p>Spinosad(1)</p>	<p>Contro questa avversità al massimo un intervento all'anno</p> <p>(1) Massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
<p>Cocciniglia (<i>Targionia vitis</i>) (<i>Planococcus citri</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici</u></p> <p>Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l'infestazione.</p> <p><u>Interventi chimici</u></p> <p>Intervenire solo sui ceppi infestati</p> <p>Per la .T vitis il periodo più idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi metà giugno metà luglio</p>	<p>Polisolfuro di calcio(1)</p> <p>Olio Minerale (1)</p> <p>Clorpirifos metile(2)</p>	<p>Trattamenti localizzati sulle piante infestate</p> <p>Al massimo 1 intervento contro l'avversità</p> <p>(1) Da impiegare a gemme ferme.</p> <p>(2) Massimo 2 Esteri fosforici x anno Indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Apate o bostrico della vite (<i>Sinoxylon sexdentatum</i>, <i>Sinoxylon perforans</i>)</p>	<p>Effettuare la lotta in caso di forti attacchi ricorrendo a provvedimenti di tipo agronomico.</p>		<p>- Appendere da metà aprile a metà maggio lungo i filari fascine-escia di tralci di potatura per attirare le femmine ovideponenti.</p> <p>A metà giugno, a ovideposizione ultimata, le fascine vanno rimosse e bruciate per distruggere uova e larve presenti.</p>
<p>Ragnetto giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)</p> <p>Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici</u></p> <p>Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono al vigore vegetativo</p> <p><u>Soglia di intervento</u></p> <p>- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti</p> <p>- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti</p>	<p>Clofentezine</p> <p>Exitiazox</p> <p>Fenazaquin</p> <p>Tebufenpirad</p> <p>Pyridaben</p> <p>Etoxazole</p>	<p>Massimo un trattamento acaricida all'anno al superamento della soglia di tolleranza e su consiglio dell'assistenza tecnica regionale.</p> <p>L'impiego dello zolfo come antiodico può contenere le popolazioni degli acari a livelli accettabili</p>
<p>Acariosi della vite (<i>Calepitrimerus vitis</i>)</p>	<p><u>Interventi chimici</u></p> <p>Intervenire solo in caso di forte attacco</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nell'annata precedente - in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli 	<p>Fenazaquin</p> <p>(Fenazaquin+Exitiazox)</p> <p>Olio minerale + Zolfo (1)</p>	<p>Massimo un trattamento acaricida all'anno al superamento della soglia di tolleranza e su consiglio dell'assistenza tecnica regionale.</p> <p>L'impiego dello zolfo come antiodico può contenere le popolazioni degli acari a livelli accettabili</p> <p>(1) Non impiegare dopo gemma cotonosa</p>
<p>NEMATODI (<i>Xiphinema index</i>)</p>	<p>- Ricorrere a materiale da riproduzione proveniente da vivai che ne garantiscano la sanità e la certificazione .</p>		