

# DISERBO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Metamitron	30,4 50,0	1,5 – 3 2 - 3	<b>(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) S-Metolaclo (2) Metamitron	44,37 86,5 50,0	3 0,50 2 - 3	<b>20 giorni di carenza</b> <b>(1) Non ammesso su bietola da foglia</b> <b>(2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto</b>
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) (2) (3)	44,37	0,5 - 3	<b>20 giorni di carenza</b> <b>(1) Non ammesso su bietola da foglia</b> <b>(2) Intervenire con la coltura a 2 foglie vere</b> <b>(3) Le dosi più basse possono essere utilizzate in post emergenza precoce con interventi ripetuti</b>

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***