

# DISERBO INDIVIA SCAROLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Benfluralin (2)	30,4 19,2	1,5 - 3 6,50	<b>(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto.</b> Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. Utilizzare in presenza di infestanti emerse <b>(2) Interrare il prodotto dopo la distribuzione</b>
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	1 -1,5	<b>Non in utilizzare in terreni sciolti</b>
<b>Pre e post semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	3 - 4	<b>(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.</b>
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop - p - etile	10,9 9,4 5	2 - 3 1 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***