

DISERBO POMODORO DA PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina e Pre Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) (2) Napropamide	30,4 41,85	1,5 – 3 2 - 3	(1) Le dosi maggiori sono utilizzabili solo in strategie finalizzate all'eliminazione di infestanti perenni (2) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin Aclonifen	35 49,6	0,15 - 0,25 1,5 - 2	Non intervenire in terreni sabbiosi Sono ammessi solo interventi localizzati sulla fila
Pre Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen Flufenacet Metribuzin Oxadiazon Pendimetanil S-Metolaclo (1) Flufenacet + Metribuzin	49,6 60 35 34,86 38,72 86,5 42,0 + 14	1,5 - 2 0,6 - 0,85 0,3 - 0,5 1 1,75 1 - 1,5 1 – 1,2	(1) Intervenire almeno 10 giorni prima del trapianto
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	0,03 - 0,05	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute Si consigliano interventi localizzati sulla fila
		Metribuzin	35	0,2 - 0,5	In presenza di portulaca la dose può salire fino a Kg 1 per Ha Si consigliano interventi localizzati sulla fila
		Clomazone	30,74	0,2 – 0,25	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-etile Isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Cletodim	10,9 4,93 5 9,7 25	1,5 – 2,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 0,6	Si consigliano interventi localizzati sulla fila