

DISERBO LATTUGA A CESPO E LATTUGHINO IN COLTURA PROTETTA IV GAMMA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Solo trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	19,2	6,5	Interrare il prodotto dopo la distribuzione
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4 - 6	Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido e ben preparato
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	31,7	1,5	Solo su insalata a cespo
Pre e post semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	36	2,5 - 3,5	Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	6	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop - p - etile	10,9 9,7 5	1,5 – 2,5 1 - 1,2 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare