

**DISERBO CARCIOFO**

<i><b>Epoca d'impiego</b></i>	<i><b>Infestanti controllate</b></i>	<i><b>Sostanza attiva</b></i>	<i><b>% di S.a.</b></i>	<i><b>l o kg /ha</b></i>	<i><b>Limitazioni d'uso e note</b></i>
<b>Pre-trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Pendimetalin	30,4 38,72	1,5 - 3 2 ,50	(1) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre-emergenza Pre-ricaccio</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen Linuron	48,0 37,6	1,50 0,8 - 1,5	
<b>Post-emergenza Post-ricaccio</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon(1) (2) Oxifluorfen (1) (2) Metazaclor Pyridate (3)	34,86 42,9 43,1 45,0	1 - 2 0,5 – 0,75 1,5 – 2 1,3 - 2	(1) Contro l'oxalis nelle prime fasi fenologiche (2) Proteggere le foglie con opportuna schermatura; (3) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
<b>Post-emergenza Post-ricaccio</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	10,9 9,7 4,93 5	1,5 – 2,5 1 1 - 1,5 1 - 1,5	