

DISERBO CICORINO IN COLTURA PROTETTA (IV GAMMA)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-semina		Propizamide Benfluralin	36 19,2	3 – 4 6,50	
Pre-Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
		Pendimetalin	38,72	2,5	Non utilizzare in terreni sciolti
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	
Pre e post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	3 – 4	Attenzione alle colture in sucessione (1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile	10,9 9,4 5	2 – 2,5 1 – 1,2 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare