

Allegato 1A: Linee Guida Nazionali 2013 - Integrazioni alle LGN 2012

FRUTTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da limitare/escludere	Note
Melo	Ticchiolatura e Oidio	Pyraclostrobin		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melo	Oidio	Cyflufenamide		Al massimo 2 interventi all'anno
Melo	Erwinia amylovora	Acybenzolar methyle		
Melo	Erwinia amylovora	Acybenzolar methyle		
Melo	Eriofide	Abamectina		Al massimo 1 intervento all'anno
Melo	Ragnetto rosso			Nei limiti previsti per gli acaricidi
Melo e pero	Varie		Esteri fosforici	Limitare al massimo 4 all'anno
Pero	Ticchiolatura e Maculatura bruna	Pyraclostrobin		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pero	Maculatura bruna		Thiram	Limitare a 4 interventi all'anno.
Pero	Maculatura bruna	Fluazinam		3 all'anno
Pesco	Varie		Esteri fosforici	Al massimo 3 all'anno
Pesco	Maculatura batterica (Xanthomonas pruni)	Acybenzolar methyle		
Pesco	Maculatura batterica (Xanthomonas pruni)	Acybenzolar methyle		
Pistacchio	Cimice	Lambdacialotrina		Al massimo 2 all'anno, alla comparsa delle prime infestazioni (vincolante)
Pomacee, Drupacee, Vite, Agrumi, Fico d'India e Kaki	Ceratitis capitata	Deltametrina		Utilizzata come sistema Attract and Kill con attrattivi alimentari
Susino	Ragnetto rosso	Abamectina		In alternativa agli altri acaricidi

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da limitare/escludere	Note
Susino	Mosca e tripidi		Cyflutrin	
Susino	Tripidi	(Imidacloprid – Cyflutrin)		Impiegabili con i limiti previsti sulla coltura per neonicotinoidi e tripidi e in caso di contemporanea presenza di tripidi con afidi o tentredini
Tutte	Oidio		Bitertanolo	Escluso da tutte le colture
Tutte	Insetti		Polisolfuro di Calcio	Esclusi tutti gli impieghi in cui viene utilizzato come insetticida
Tutte, tranne ornamentali	Acari		Fenazaquin	Escluso da tutte le colture. Rimane solo sulle ornamentali
Vite da vino e da tavola	Muffa grigia	Fluopyram		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa al Boscalid. (nelle LGN contro Botrite al massimo 2 complessivi)
Vite da vino e da tavola	Muffa grigia	Fenpyrazamide		Al massimo 1 intervento all'anno. (nelle LGN contro Botrite al massimo 2 complessivi)
Vite da vino e da tavola	Oidio	Cyflufenamide		Al massimo 2 interventi all'anno
Vite da vino e da tavola	Tignole cocciniglie		Clorpirfos etile	Al massimo 1 intervento all'anno, rimangono due solo per il contenimento dello scafoideo. Non impiegabile oltre la fine del mese di luglio
Vite da vino, da tavola, Agrumi e Melo	Varie		Flufenoxuron	Revocato, non impiegabile dal 31/12/2012
Frutti di piante arbustive e altri frutti a bacca		Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Kaki, Fico, Agrumi	Mosca	Esche proteiche attivate con Lufenuron		Inserire

ORTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Aglio	Ruggine, marciumi bianco e verde	Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Basilico	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Inserimento nuova molecola: Max 2 tratt./anno
Basilico	Nottue fogliari	Lambdacialotrina + Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno
Bietola da costa	Phythium		Fosetil Al + Propamocarb	
Bietola da costa	Phythium	Propamocarb		
Bietola da Foglia CP IV gamma	Graminacee e Dicotiledoni	Metramitron		Precisare che il tempo di carenza è di 45 giorni
Bietola da Foglia CP IV gamma	Dicotiledoni		Metramitron	Escludere il post emergenza, mantenere il pre-emergenza
Carota	Alternaria e Oidio	Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cavoli a infiorescenza	Nottue e Tignola	Clorantraniliprole		Eliminare nota 9
Cavoli a Testa	Nottue e Tignola	Clorantraniliprole		Modificare nota 15, autorizzazione anche per cavolo verza
Cavoli a Testa	Nottue		Lufenuron	Eliminare
Cece	Diserbo pre emergenza	Aclonifen 49,5%		Dose 2,5 l/ha (in etichetta il massimo sarebbe 3)
Cetriolo p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Cicoria	Botrite e Sclerotinia	Boscalid + Pyraclostrobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Cicoria	Nottue fogliari	Deltametrina		Nei richiami per le limitazioni scrivere (8) e non 88)
Cicoria	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Cicorino CP IV gamma	Peronospora	Propamocarb + fosetil al		Inserimento nota, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Cipolla	Muffa grigia	Fenexamide		Introdurre limite di etichetta
Cipolla	Nottue terricole e Mosche	Deltametrina		Impiegabile nel rispetto delle limitazioni previste per i piretroidi. Fare attenzione ai formulati specificatamente autorizzati
Cipolla		Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cipolla	Botrite e ruggine	Boscalid + Pyraclostrobin		Inserire Nei limiti previsti per QoI e CAA
Cipolla	Botrite	Fenhexamide		Inserire Max. 3 tratt./anno ind Avv, solo in pieno campo
Culture protette di: pomodoro, melanzana, zucchino, peperone	Muffa grigia	Fenpyrazamide		Al massimo 1 intervento all'anno (2 complessivi nella LGN).
Dolcetta CA	Peronospora	Propamocarb + fosetil al		Inserimento nota, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Dolcetta CA	Graminacee	Propaquizafop		Inserire in post emergenza - graminacee
Dolcetta CA	Graminacee	Quizalofop - P - Etile		Inserire in post emergenza - graminacee
Dolcetta CA	Botrite	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind. Avv
Dolcetta CP IV gamma	Nottue fogliari	Clorantraniliprolo		Inserire con il limite previsti per la stessa s.a. sulle altre colture protette di IV gamma
Dolcetta CP IV gamma	Peronospora e Pythium	Propamocarb + fosetil al		Inserimento nota, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Dolcetta CP IV gamma	Graminacee	Propaquizafop		Inserire in post emergenza - graminacee
Dolcetta CP IV gamma	Graminacee	Quizalofop - P - Etile		Inserire in post emergenza - graminacee
Erbe Fresche	Botrite	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind. Avv
Erbe fresche	Nottue fogliari	Lambdacialotrina + Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Fagiolino			Linuron	Eliminare
Fagiolino	Piralide	Clorantraniliprole		Ne limiti previsti sulla coltura
Fagiolino	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 3 tratt./anno ind Avv
Fagiolo			Linuron	Eliminare
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Afidi	Imidacloprid + Ciflutrin		Eliminazione Nota 3 perché in contrasto con l'uso in miscela dell'imidacloprid
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Altica	Imidacloprid + Ciflutrin		Eliminazione Nota 4 perché in contrasto con l'uso in miscela dell'imidacloprid
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Afidi e tripidi	Lambdacialotrina		Inserire in alternativa agli altri piretroidi
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Peronospora e Pythium	Propamocarb + fosetil al		Inserimento nota, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Graminacee	Propaquizafop		Inserire in post emergenza - graminacee
Foglie e germogli di Brassica CP IV gamma	Graminacee	Quizalofop - P - Etile		Inserire in post emergenza - graminacee
Indivia Riccia	Botrite e Sclerotinia	Boscalid + Pyraclostobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Indivia Riccia	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv
Indivia riccia e scarola			Metalaxyl-M	Ammesso solo in pieno campo
Indivia Scarola	Botrite e Sclerotinia	Boscalid + Pyraclostobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Indivia Scarola	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv
Lattuga CP IV gamma	Peronospora e Pythium	Propamocarb		Inserimento nota, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Lattuga CA	Marciumi Basali	Boscalid + pyraclostrobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Lattuga CA	Peronospora e Pythium	Propamocarb		Inserimento Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Lattuga CA	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Lattuga e Lattughino, pieno campo e coltura protetta	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Lattughino CA	Peronospora e Pythium	Propamocarb		Inserimento Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Lattughino CA	Botrite e Sclerotinia	Pyrimethanil		Inserimento nota specifica, Max. 2 tratt./anno ind. Avv.
Lattughino CP IV gamma	Marciumi Basali	Boscalid + pyraclostrobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Lattughino CP IV gamma	Peronospora	Fenamidone + Fosetil-Al		Va specificato che la limitazione è relativa al Fenamidone e non al Fosetil Al
Lattughino CP IV gamma	Peronospora e Pythium	Propamocarb		Inserimento Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Melone	Peronospora	Propineb		Inserimento, al massimo 2 interventi all'anno
Melone pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Mias dolce			Teflutrin	Escludere
Patata	Tignola	Lambdacialotrina		Inserire in alternativa e nei limiti previsti per la deltametrina
Patata, Fagiolino e Sedano	Nottue terricole	Deltametrina		Impiegabile nel rispetto delle limitazioni previste per i piretroidi. Fare attenzione ai formulati specificatamente autorizzati
Patata, Pomodoro	Diserbo pre emergenza Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet (42%) Metribuzin 14%		2 - 1,2 kg./ha
Peperone p.c. e c.p.	Botrite	Fenhexamide		Inserire Max. 3 tratt./anno ind Avv,

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Pieno campo e serra di: Pomodoro, Peperone, Melanzana, Spinacio, Lattuga, Fragola	Spodoptera littoralis	Spodoptera littoralis Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)		
Pomodoro c.p.	Botrite	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 3 tratt./anno ind Avv
Pomodoro CP	Nottue e tripidi	Lufenuron		Al massimo. 2 tratt./anno e solo in coltura protetta
Prezzemolo	Phythium		Fosetil Al + Propamocarb	
Prezzemolo	Phythium	Propamocarb		
Prezzemolo	Tripidi		Lambdacialotrina	Eliminare
Prezzemolo	Peronospora	Metalaxil -M + Rame		Eliminare nota. Ammesso l'impiego anche in coltura protetta con il nuovo formulato
Prezzemolo	Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind. Avv
Prezzemolo	Nottue fogliari			
Radicchio	Botrite e Sclerotinia	Boscalid + Pyraclostobin		Portare la nota ai QoI vicino al Pyraclostrobin e non al Boscalid
Rucola CA	Afidi e altica	Acetamiprid		In alternativa e nei limiti già previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Rucola CA	Peronospora e Pythium	Propamocarb + fosetil al		Inserimento nota specifica, Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Rucola CA	Botrite e Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv
Rucola CP IV gamma	Peronospora e Pythium	Propamocarb + fosetil al		Inserimento Max. 2 tratt./ciclo ind. Avv.
Rucola CP IV gamma	Graminacee	Propaquizafop		Inserire in post emergenza - graminacee
Rucola CP IV gamma	Graminacee	Quizalofop - P - Etile		Inserire in post emergenza - graminacee
Rucola CP IV gamma	Sclerotinia	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 2 tratt./anno ind Avv

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Escludere o limitare	Note
Rucola p.c. e c.p.	Varie		Pyraclostrobin + Dimetomorf	
Scalogno		Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Sedano	Mosca, insetti terricoli	Teflutrin		In alternativa alla deltametrina e nei limiti previsti per i piretroidi. Non ammesso in coltura protetta. Precisare le specie per le quali la s.a. è autorizzata
Spinacino CP IV gamma	Patogeni tellurici		Metam - K e Na	Eliminare
Tutte le colture nelle quali ne è previsto l'impiego	Varie - Patogeni tellurici	Metam Na e Metam K		Inserito in allegato I, ma impiegabile solo una volta ogni 3 anni. L'applicazione in serra solo per irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
Tutte tranne le frutticole	Diserbo		Fluazifop-p-butyle	Escluso da tutte le colture orticole, erbacee e floricole
Tutte, tranne ornamentali	Acari		Fenazaquin	Escluso da tutte le colture. Rimane solo sulle ornamentali
Valerianella	Nottue	Clorantranilprole		Inserire al massimo 2 all'anno - coltura protetta
Zucca	Ragnetto rosso	Abamectina		In alternativa agli altri acaricidi
Zucchini	Botrite	Fenhexamide		Aggiungere nota Max. 3 tratt./anno ind Avv
Zucchini p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i Qol (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)

CAVOLI

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Cavolfiore	Nottue, Cavolaia, Tignola delle crucifere	Clorantraniliprole		Ammesso anche su cavolfiore, togliere limitazione
Cavoli a foglia	Afidi, Tentedini, Nottue, Cavolaia		Cyflutrin	Revoca
Cavoli a infiorescenza	Phythium		Fosetil Al + Propamocarb	Ammesso solo in semenzaio
Cavoli a infiorescenza	Phythium	Propamocarb		
Cavoli a testa	Nottue e cavolaia		Lufenuron	Revoca
Cavoli a testa	Nottue e cavolaia	Lambdacialotrina + Clorantraniliprole		Nelle note correggere la nota 10, indicandola come nota 18
Cavoli a testa e cavoli a foglia	Vari		Cyflutrin	Revoca
Cavolo rapa	Nottue, Cavolaia		Cyflutrin	Revoca
Tutte tranne le frutticole	Diserbo		Fluazifop-p-butyle	Escluso da tutte le colture orticole, erbacee e floricole

ERBACEE

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere o limitare	Note
Frumento	Diserbo	(Pyroxsulam + Florasulam)		Modifica concentrazione: Pyroxulam 7,08 e Florasulam 1,42
Frumento	Diserbo	Pinoxaden		Concentrazione 5, 10 % e dose 1 l/ha
Frumento	Diserbo	Bifenox		Concentrazione 40,8 10 % e dose 2 l/ha
Frumento	Diserbo	Propoxicarbazone Na + Iodosulfuron+ Amidosulfuron + Mefenpyr		Modifica concentrazione: Propoxicarbazone Na 14 % + Iodosulfuron 0,86% + Amidosulfuron 6% + Mefenpyr 6%: dose 400 G/HA
Mais	Diserbo		Acetoclor	Revocato, non impiegabile dal 30/06/2013 (lasciare in tabella con l'indicazione della limitazione all'impiego)
Mais	Diserbo post emergenza Graminacee e Dicotiledoni	Dimetenamid-P puro 212,5 g/L + Pendimetalin puro 250 g/L)		
Mais	Elateridi		geodisinfestanti	Limitazioni per la geodisinfestazione del mais. Sempre localizzato Tranne che nei terreni in cui il mais segue se stesso, l'erba medica, prati, erbai e patata la geodisinfestazione può essere eseguita solo alle seguenti condizioni: - La geodisinfestazione non può essere applicata su più del 30% dell'intera superficie aziendale. Tale superficie può essere aumentata al 50% nei seguenti casi: - monitoraggio con trappole: cattura cumulativa di 1000 individui - monitoraggio larve con vasetti: presenza consistente

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere o limitare	Note
Riso	Punteruolo	Lambdacialotrina		Impiegare su non più del 50% della superficie. Una volta all'anno
Riso	Diserbo	Profoxidim		Impiegabile sull'intera superficie destinata alla coltura del riso
Soia	Diserbo pre emergenza Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet (42%) Metribuzin 14%		1 - 1,2 kg./ha
Barbabietola	Altica, Cleono, Mamestra, Nottue terricole, Casside		Cyflutrin	
Barbabietola	Altica	(Imidacloprid – Cyflutrin)		Impiegabile con i limiti previsti sulla coltura per neonicotinoidi e piretroidi
Tabacco	Nottue e Pulce		Cyflutrin	
Tabacco	Pulce	(Imidacloprid – Cyflutrin)		Impiegabile con i limiti previsti sulla coltura per neonicotinoidi e piretroidi
Tutte tranne le frutticole	Diserbo		Fluazifop-p-butyle	Escluso da tutte le colture orticole, erbacee e floricole

FLORICOLE E FUNGHI

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Ornamentali e Floreali solo in serra	Marciumi	Boscalid + Pyraclostrobin		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Funghi	Ditteri Sciaridi		Nemasis	Escludere il riferimento al formulato commerciale e lasciare la s.a.
Floricole	Diserbo		Teflutrin	
Floricole	Diserbo		Propaclar	
Floricole	Diserbo		Diclobenil	

INTEGRAZIONE 22 FEBBRAIO 2012

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Aglione	Tripidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Barbabietola	Nottue	Indoxacarb		Nei limiti previsti dalle LGN
Basilico	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Bietola rossa	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Carciofo	Afidi e nottue	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Carota	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Cavoli a testa	Nottue fogliari e afidi, Tignola delle crucifere e Aleurodidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Cetriolo	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Cetriolo	Afidi, Aleurodidi	Sali potassici di acidi grassi		
Colza	Meligete e Altica	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Erba medica	Fitonomo	Cipermetrina		Nel limite complessivo di 1 intervento insetticida indipendentemente dall'avversità
Fagiolo	Afidi e nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Fragola	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Frumento	Oidio, Ruggine, Septoria e Fusarium	Pyraclotrobin		
Frumento tenero e duro	Septoria, Oidio, Ruggine	Picoxystrobin		Nel limite complessivo dei fungicidi impiegabili in un anno.
Funghi	Varie		Tiabendazolo	Revocato
Lattuga e simili	Sclerotinia e peronospora	Bacillus amyloliquefaciens		
Lattughe e simili pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Mais	Elateridi	Clothianidin		Amnesso nel nord Italia e nelle regioni Sardegna, Umbria e Marche. Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Mais	Elateridi	Cipermetrina		Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Mais	Diabrotica	Indoxacarb		Nei limiti previsti dalle LGN
Mais dolce	Elateridi	Cypermetrina		Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Melanzana	Nottue terricole	Cipermetrina		1 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non amnesso in coltura protetta
Melanzana	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Melo e Pero	Afidi	Sali potassici di acidi grassi		
Melo e Pero	Psilla	Sali potassici di acidi grassi		
Melone	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Melone	Afidi, Aleurodidi	Sali potassici di acidi grassi		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Melone, cocomero	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Ornamentali	Afidi, Aleurodidi, Acari, Cicaline, Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi		
Patata	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Peperone	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Pero	Maculatura bruna	Bacillus amyloliquefaciens		
Pero e Melo	Erwna amylovora	Bacillus amyloliquefaciens		
Pesco	Afidi	Sali potassici di acidi grassi		
Pomodoro cp e pc	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Pomodoro	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Pomodoro			Mancozeb	Era rimasto per un refuso
Pomodoro cp	Botrite del fusto	Imazil		
Pomodoro cp, melanzana cp, fagiolino cp, cetriolo cp, Fragola cp	Ragnetto rosso	Pyridaben		Alle condizioni previste per la difesa dagli acari
Pomodoro, Peperone, Melanzana	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Ratticida	Bromadiolone	Precauzioni		Inserito nelle norme generali con indicazioni sulle modalità di utilizzo
Ravanello	Afidi e Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Ribes	Oidio	Penconazolo		
Scalognò	Tripidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Tabacco	Nematodi	Oxamyl		
Vite	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei Ditiocarbammati.
Vite	Oidio	Pyraclotrobin		
Vite	Cicaline	Sali potassici di acidi grassi		
Vite da vino e da tavola	Muffa grigia e marciume acido	Bacillus amyloliquefaciens		
Zucchini	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA

INTEGRAZIONE 15 MAGGIO 2012

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella)	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, ecc.)	Cocciniglie e Mosca bianca e altri Aleurodidi	Buprofezin		
Basilico p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per taglio
Cavoli a foglia	Diserbo		Piridate	
Cavoli a infiorescenza	Diserbo	Piridate		
Cavoli a testa	Diserbo	Piridate		
Cavoli rapa	Diserbo	Piridate		
Cetriolo coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Cetriolo p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Ciliegio, Susino	Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età. Non impiegabile nel 2012
Cocomero p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Colture floreali e Ornamentali	Cocciniglie e Aleurodidi	Buprofezin		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Colture protette: Pomodoro, Melanzana Lattuga, Cetriolo, Zucchini, Peperone	Aleurodidi	Buprofezin		
Erbe fresche p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per ciclo, indipendentemente dall'avversità
Fagiolino	Diserbo		Piridate	
Fagiolino coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Floreali e ornamentali p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Foglie e germogli di brassica coltura protetta	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 1 intervento per taglio
Fragola coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Girasole	Diserbo post emergenza	Tribenuron		Impiegabile solo su cvs resistenti

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Indivia riccia e scarola, radicchio, cicoria, cicorino, dolcetta, rucola, foglie e germogli di brassica			Ametotradina + Dimetomorf	Impiegabile solo su lattuga e non sul gruppo delle lattughe come erroneamente indicato nella modifica dello scorso febbraio
Kiwi	Cocciniglie (Pseudolacaspis pentagona)	Buprofezin		Cocciniglie (Pseudolacaspis pentagona) intervenire preferibilmente in migrazione della prima generazione dell'anno (maggio).
Melanzana coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melo, Pero	Cocciniglie e Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		
Melo, Pero	Contro Cicaline	Buprofezin		Solo per le Regione che hanno questa avversità
Melo, Pero, Pesco, Pomodoro (pc e cp), Melanzana (pc e cp)	Panonychus ulmi e Tetranychus urticae	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa agli altri acaricidi previsti nelle norme di coltura
Melone p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Melone pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Olivo	Cocciniglie (<i>Saissetia oleae</i>)	Buprofezin		Al massimo 1 intervento all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Peperone coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pesco, Albicocco	Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		
Pesco, Albicocco	Cocciniglia bianca	Buprofezin		
Pesco, Albicocco	(<i>Diaspis pentagona</i>)	Buprofezin		
Pesco, Albicocco	Cicaline	Buprofezin		Solo per le Regioni che hanno questa avversità
Pomodoro coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. In caso di impiego di 3 interventi è necessario alternarlo con altre sostanze
Prezzemolo p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 1 intervento per ciclo
Ribes p.c. e c.p.	Oidio	Penconazolo		
Rucola p.c. e c.p.	Peronospora e Alternaria	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per taglio
Rucola p.c. e c.p.	Varie		Pyraclostrobin + Dimetomorf	
Spinacio in coltura protetta			Metam Na e Metam K	
Susino	Cydia Funebrana	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Vite	Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i>)	Buprofezin		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Vite	Cocciniglie	Buprofezin		
Zucca p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchini coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchini p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb e Mandipropamide ecc.)
Zucchini pieno campo	Oidio	Quinoxifen + zolfo		Al massimo 3 interventi all'anno (verificare i tempi di carenza)

INTEGRAZIONI DISERBO 22 FEBBRAIO E 15 MAGGIO 2012

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca	% s.a.	Dose ha KG.- L/HA	Limitazioni e Note
Soia	Tifensulfuron metile	Post emergenza	50	0,012	Va ridotta la dose a seguito della modifica dell'etichetta. Prima la dose era di 0,01 l/ha, ma la concentrazione era del 75% di s.a.
Mais	Tifensulfuron metile	Post emergenza	50	0,015	Va ridotta la dose a seguito della modifica dell'etichetta. Prima la dose era di 0,01 l/ha, ma la concentrazione era del 75% di s.a.
Frumento tenero e duro	Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Amidosulfuron + Mefenpyr Diethyl	Post emergenza precoce	14 + 0,83 + +6,00 + 6,70	0,333	
Frumento tenero e duro	Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr Diethyl	Post emergenza precoce	16,8 + 1,00 + 8,00	0,4	
Mais	Tembotrione + Isoxadifen-ethyl	post precoce	4,4 + 2,2	2	
Mais	Isoxaflutolo + Cyprosulfamide	Pre o Post emergenza precoce	4,4 + 4,4	1,7 - 2	
Mais	Isoxaflutolo + Thiencarbazone + Cyprosulfamide	Pre emergenza o Post emergenza precoce	3,97 + 1,59 + 2,62	1,7 - 2	Al massimo un intervento all'anno

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca	% s.a.	Dose ha KG. - L/HA	Limitazioni e Note
Erba medica, Carciofo, Asparago, cavolo broccolo, cavpolo di Bruxelles, cavolo, Cavolfiore, aglio, scalogno, erbe fresche, prezzemolo, foglie di sedano, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, mais dolce, pisello, cece, lenticchia, fagiolo, tabacco. Fagiolino, Basilico	Piridate	Post emergenza e Post trapianto	45	1,3 - 2	Su cipolla limitare la forbice a 0,5 l/ha
Patata	Metribuzin + Clomazone	Pre-emergenza	19,3 + 4,97	1,5	
Soia	Metribuzin + Clomazone	Pre-emergenza	19,3 + 4,97	1,5	
Patata	Napropamide		41,85	2 - 3	
Pmodoro	Napropamide		41,85	2 - 3	

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca	% s.a.	Dose ha KG. - L/HA	Limitazioni e Note
Melanzana	Napropamide		41,85	2 - 3	
Foglie e steli di brassica		Propizamide			
Vite, Melo, Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Nocciolo	Pyraflufen-ethile	Spollonante o Sinergizzante	2,6 % -	all'anno	Da usare in alternativa al Carfentrazone, nelle colture nelle quali è previsto l'impiego di tale prodotto.
Patata	Pyraflufen-ethile	Dissecante in pre-raccolta	2,6 % -	0,8 l/ha per trattamento, con il limite di; 1,6 l/ha all'anno	