

### Allegato 1A: Linee Guida Nazionali 2013 – Proposta per gestione resistenze ai diserbanti

Viene avviata la discussione sulle seguenti modifiche da proporre per la gestione delle resistenze ai diserbanti. Si propone di approfondire l'argomento in successivi incontri in modo da definire modifiche da apportare nei prossimi anni

|          |         |   |  |
|----------|---------|---|--|
| Frumento | Diserbo | ACCasi e ALS/graminicida                                    | Vincolante alternarli negli anni in cui sullo stesso appezzamento si coltiva il frumento   |
| Frumento | Diserbo | Clortoluron   | Impiegabile al massimo 1 volta ogni 5 anni sullo stesso appezzamento   |
| Frumento | Diserbo | Ioxynil o Bromoxynil  | Impiegabile sullo stesso appezzamento al massimo 1 volta ogni 5 anni. 1 in alternativa all'altro   |
| Mais     | Diserbo | ALS/graminicidi   | <u>- Terreni non torbosi con meno del 2,5% di sostanza organica:</u><br>- Impiegare sulla coltura 1 volta ogni 2 (Alternare). Solo in caso di presenza di sorghetta da rizoma ammesso l'uso di ALS/graminicidi tutti gli anni e comunque è necessario intervenire, almeno ad anni alterni, con altri graminicidi in pre emergenza o post anticipata. |
| Mais     | Diserbo | ALS/graminicidi HPPD (Mesotrione, Tembotrione, Sulcotrione) | <u>- Terreni torbosi con più del 2,5% di sostanza organica, dove non si effettua il pre-emergenza:</u><br>- Ammesso l'impiego tutti gli anni di ALS/graminicidi; se si tratta contro le graminacee prescritto l'uso di HPPD (Mesotrione, Tembotrione, Sulcotrione) almeno 1 volta ogni 2 anni  |
| Mais     | Diserbo | Terbutilazina   | Impiegare sulla coltura 1 volta ogni 2 (Alternare). Limitazione non prevista su terreni torbosi con almeno il 2,5% di sostanza organica, dove non si effettua il pre-emergenza   |
| Pomodoro | Diserbo | ACCasi  | Quando si fa più di 1 trattamento graminicida in post emergenza, almeno 1 trattamento deve essere eseguito con prodotti ACCasi   |