

ALLEGATO N. 1 . Integrazione alle Linee Guida Nazionali 2013 per la difesa integrata delle colture ed il controllo integrato delle infestanti

Coltura/Scheda	Avversità	Sostanza attiva inserire	S.a da escludere o da limitare	Note e Limitazioni
Olivo	Mosca	Attrack and kill con Deltametrina		
Melo	Erwinia amylovora	Prodotti rameici, Fosetyl-Al, Bacillus subtilus		
Melo	Cemiosoma	Inserire soglia		
Melo	Afidi, cocciniglia	Spyrotetramat		Inserire limitazione: impiegabile solo in post fioritura
Pero	Ticchiolatura	Thiram		Da limitare a 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pesco	Maculatura batterica			Modificare denominazione avversità (Cancro o maculatura batterica) e il nome scientifico (inserendo il sinonimo X. arboricola pv. Pruni, che è quello presente in etichetta e utilizzato da EPPO
Vite da tavola	Botrite e Marciume degli acini	Cyprodinil e Pyrimetanyl		Armonizzate le note che non erano coerenti (manca il riferimento ai tendoni coperti)
Vite da tavola	Marciume degli acini		Fludioxonil	Contro questa avversità non è registrato da solo, ma insieme a Cyprodinyl

Vite da vino e da tavola	Peronospora	Propineb		Aggiunto: Non ammesso in fioritura
Vite da vino	Escoriosi		Pyraclostrobin	Contro questa avversità non è registrato da solo, ma insieme a Metiram
Ribes	Oidio	Penconazolo	Penconazolo	Ammesso e da limitare solo al pieno campo
Ribes	Botrite		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Ammesso e da limitare solo al pieno campo e con un massimo di 2 interventi all'anno
Mirtillo	Botrite		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Ammesso e da limitare solo al pieno campo e con un massimo di 2 interventi all'anno
Lampone	Botrite		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Ammesso e da limitare solo al pieno campo e con un massimo di 2 interventi all'anno
Rovo	Botrite		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Ammesso e da limitare solo al pieno campo e con un massimo di 2 interventi all'anno
Fragola - Post impianto	Fitoftora		Metalxyl-M	Non autorizzato in questa fase
Fragola - Ripresa vegetativa pc	Nottue terricole		Metiocarb	Non autorizzato contro questa avversità
Cavoli	Pythium		Propamocarb + Fosetyl al	Non autorizzato in pieno campo, ma solo in semenzaio
Lattughe e simili	Pythium	Propamocarb	Propamocarb + Fosetyl al	Non autorizzato in pieno campo, ma solo in semenzaio
Cavoli	Pythium	Propamocarb		
Lattughe e simili	Pythium	Propamocarb		

Cavoli a infiorescenza	Nottue, cavolaia e tignola		Clorantraniliprole (da solo e in miscela con Lambdacialotrina)	Non ammesso in coltura protetta
Cavoli a infiorescenza	Nottue e cavolaia		Lambdacialotrina	Non ammessa in coltura protetta
Cavoli a infiorescenza	Mamestra	Lambdacialotrina		Inserire in alternativa agli altri piretroidi. Non ammessa in serra
Cavoli a foglia	Mamestra		Indoxacarb	Non ammessa contro questa avversità
Cavoli a testa	Nottue	Metaflumizone		Togliere non ammesso su cavolo verza
Aglione	Tripidi		Cipermetrina	Avversità erroneamente inserita. Va esclusa
Cipolla	Ruggine		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Avversità erroneamente inserita. Va esclusa
Basilico	Aleuroodidi e acari		Sali potassici e acidi grassi	Avversità erroneamente inserite. Vanno escluse
Basilico	Marciumi molli			Sostituire Botrytis squamosa (specifico per genere Allium) con B. cinerea, generalmente associata al Basilico; inoltre è questa botrite indicata in etichetta
Basilico	Tripidi	Deltametrina		Inserire in alternativa e nei limiti già previsti per piretroidi e deltametrina stessa

Rucola	Alteraria	Metalaxyl - + prodotti rameici		
Sedano	Mosche		Teflutrin	Non autorizzato contro questa avversità
Sedano	Nottue terricole (Agrotis)	Teflutrin		Inserire su questa avversità e, essendo utilizzato al terreno, non va posto in alternativa agli altri piretroidi
Spinacio	Nottue fogliari			Inserita anche Mamestra brassicace
Cetriolo	Aleurodidi		Pyreproxifen	Inserire ammesso solo in serra
Cocomero	Nottue fogliari	Cipermetrina		In coerenza con i limiti già previsti il prodotto deve essere inteso in alternativa agli altri piretroidi e nei limiti di un piretroide all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone	Nottue fogliari	Cipermetrina		In coerenza con i limiti già previsti il prodotto deve essere inteso in alternativa agli altri piretroidi e nei limiti di un piretroide all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone	Peronospora		Ametoctradin + Dimetomorf	Ammesso e da limitare solo al pieno campo
Melone	Aleurodidi		Pyreproxifen	Non ammesso sulla coltura

Melanzana	Tarsonemidi (solo per il sud)	Sali potassici e acidi grassi		
Melanzana	Afidi			Inserito Aphis gossypii
Melanzana	Nematodi		Azadiractina	Non autorizzato contro questa avversità
Melanzana	Patogeni tellurici		Dazomet	Inserire, come da etichetta, impiegabile una volta ogni 3 anni. Impiegabile prima della semina e/o al trapianto
Melanzana	Varie		Pymetrozine	In coerenza con quanto riportato sulle altre colture ammesso solo in serra al massimo 2 interventi all'anno e solo se si lanciano insetti utili
Peperone	Patogeni tellurici		Dazomet	Inserire, come da etichetta, impiegabile una volta ogni 3 anni. Impiegabile prima della semina e/o al trapianto
Peperone	Tignola del pomodoro		Metaflumizone	Ammesso solo in serra
Pomodoro pc	Nematodi		Azadiractina	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro pc	Septoriosi		Zoxamide	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro sud	Nematodi		Azadiractina	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro sud	Septoriosi		Zoxamide	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro cp	Nematodi		Azadiractina	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro cp	Septoriosi		Zoxamide	Non autorizzato contro questa avversità

Pomodoro cp	Patogeni tellurici		Dazomet	Inserire, come da etichetta, impiegabile una volta ogni 3 anni. Impiegabile prima della semina e/o al trapianto
Pomodoro cp	Cladosporiosi	Propineb	Mancozeb	
Pomodoro cp	Septoriosi		Azoxystrobin	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro cp	Marciumi da Pythium		Propamocarb + Fosetyl al	Precisare che può essere utilizzato solo con impianti a goccia o con distribuzione localizzata
Foglie e germogli e steli di brassica	Varie		Pymetrozine	In coerenza con quanto riportato sulle altre colture al massimo 2 interventi all'anno e solo se si lanciano insetti utili
Lattughino	Varie		Pymetrozine	In coerenza con quanto riportato sulle altre colture al massimo 2 interventi all'anno e solo se si lanciano insetti utili
Lattuga a cespo cp	Nematodi		Azadiractina	Non autorizzato contro questa avversità
Carota	Alternaria e botrite		Pyrimetaniil	Da etichetta deve essere limitato a due interventi all'anno e non per ciclo
Floricole	Tutte		Flufenoxuron	Prodotto revocato

Floricole e ornamentali ((crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali)	Acari	Fenazaquin		Inserire in alternativa e nei limiti previsti per gli altri acaricidi
Floricole	Liriomyza		Bacillus thuringiensis	Non autorizzato contro questa avversità
Floricole	Cetonia		Piretro	Non autorizzato contro questa avversità
Floricole e ornamentali	Elateridi e maggiolini	Teflutrin e zetacipermetrina		Essendo utilizzati sul terreno, il loro utilizzo non va calcolato in alternativa agli altri piretroidi
Cavoli a infiorescenza	Sclerotinia		(Boscalid + Pyraclostrobin)	Non autorizzato contro questa avversità
Bietola da foglie cp	Rhizoctonia	Tricoderma asperellum	Tricoderma harzianum	
Cavolo rapa	Marciumi basali	Tricoderma asperellum	Tricoderma viride	Aggiungere anche autorizzato solo contro Rhizoctonia
Rafano	Marciumi basali	Tricoderma asperellum	Tricoderma viride	Aggiungere anche autorizzato solo contro Rhizoctonia
Peperone	Tarsomenidi	Acidi grassi		

Coltura/Scheda	Avversità	s.a. Inserire	s.a Escludere	Note e Limitazioni
Pero	Diserbo e spollonatura	Pyraflufen-ethile		Dimenticato negli aggiornamenti precedenti. Inserire come per il melo e le drupacee
Patata	Tignola	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a infiorescenza pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a testa pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a foglia pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pisello pc	Mamestra, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolo pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolino pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi

Cipolla pc	Nottue, tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Scalogno pc	Tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo pc e cp	Nottue fogliari, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi, altica, nottue fogliari, atomaria, cassida, mamestra, cleono	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais	Nottue, diabrotica, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais dolce	Nottue, Afidi, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Erba medica	Apion, fitonomo	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Tabacco	Nottue, afidi, pulce	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Floreali e ornamentali pc e cp	Afidi, tripidi, aleurodidim , tortricidi e bega, nottue fogliari, maggiolino,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi e comunque non più di 3 all'anno

Pomodoro pc	Afidi, Aleurodidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Colza	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Floreali	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Patata	Tignola	Thiacloprid		Al massimo 1 intervento all'anno
Patata	Tignola	Lambdacialotrina		Nei limiti complessivi previsti per i Piretroidi
Patata	Peronospora	Almisulbron		Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide
Melone cp	Ragnetto rosso e Aleurodidi	Spyromesifen		Da inserire solo se avversità sono già presenti nelle LGN, nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno
Cocomero cp	Ragnetto rosso e Aleurodidi	Spyromesifen		Da inserire solo se avversità sono già presenti nelle LGN, nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno

Zucca cp	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Da inserire solo se avversità sono già presenti nelle LGN, nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno
Pesco	Bolla, batteriosi, corineo, fusicocco, cancri rameali	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in gegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Albicocco	Corineo, nerune, apiognomonìa, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in gegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Susino	Ruggine, Corineo, nerune delle drupcee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in gegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Ciliegio	Corineo, nebbia o seccume delle drupacee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in gegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Melo	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolaori di crescita
Pero	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolaori di crescita

Pesco	Cydia molesta	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolaori di crescita
Susino	Cydia funebrana	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno
Sorgo	Diserbo di pre emergenza	Terbutilazina (25%) + Pendimetalin (5,9%		Alla dose di 2,5 l./ha
Pomodoro pc	Myzus persicae e Aphis gossipii	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana pc	Myzus persicae e Aphis gossipii	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Cicoria pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Radicchio pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia scarola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Dolcetta pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Rucola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno

Foglie e germogli pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattughino pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Pomodoro pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Peperone pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Spinacio e Spinacino pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Albicocco e Pesco	Anarsia	Metoxifenozone		Al massimo 2 all'anno
Melo, Pero	Varie		Metoxifenozone	Limitare a 3 all'anno
Lattuga pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno
Cicoria pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno
Dolcetta pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno
Rucola pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno

Lattughino pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Erbe fresche pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Prezzemolo pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Bietole da foglia e da costa pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Basilico pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Spinacio pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi all'anno
Sedano pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Finocchio pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Ciliegio	Rhagoletis cerasi	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi e comunque non più di 2 interventi con questa s.a.
Albicocco	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Susino	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura

Pesco	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Agrumi	Calocoris trivialis, Ceratitis capitata, Phyllocnistis citrella	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Patata	Peronospora	Dimetomorf + Metiram		Nei limiti previsti con CAA e Ditiocarbammati sulla coltura
Pomodoro pc e sud	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Pomodoro cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Lattuga	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cetriolo pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Zucchino pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.

Melone pc	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cocomero pc	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Uva da tavola	Tripidi	Formetanate		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa e nel numero complessivo previsto per gli esteri fosforici
Pesco	Tripidi	Formetanate		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa e nel numero complessivo previsto per gli esteri fosforici
Patata	Antracnosi	Azoxystrobin		Nei limiti previsti per i QoI
Tutte le colture in cui è inserito	Patogeni tellurici		Metam Na e Metam K	La limitazione all'impiego una volta ogni tre anni, va rinviata al 31 dicembre 2014
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	IBE		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	QoI		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi

Orzo	Diserbo	Fenoxaprop-petyle		Inserire alle condizioni previste per il frumento
Vite	Tripidi - Nottue Val D'Aosta		Cyflutrin	Esclusione
Vite	Scafoideo	Buprofezin		Inserire alle condizioni previste per la coccinglia
Lattuga e bietola da costa	Varie		Pencicuron	Revocato
Cavolo rapa e cavolo a foglia	Varie	Lambdacialotrina		In alternative e nei limiti previsti per i piretroidi
Colza	Diserbo post emergenza	Imazamox + Metazachlor		Per specifiche varietà autorizzate. 2 litri/ha con formulati con concentrazione della s.a. rispettivamente dell'1,6 e del 33,5% . Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
Fagiolo	Oidio	Azoxystrobin + Difeconazolo		Con il limite di 2 interventi all'anno. Inserire anche l'avversità
Pomodoro c.p.	Muffa grigia allo stelo	Imazalil		Per formulati spray eliminare vincolo dei 2 trattamenti all'anno
Fragola pre e post impianto, ripresa vegetativa e pre raccolta pieno campo	Vaiolatura	Dodina		

Agrumi	Tripidi		Acrinatrina	Esclusione
Vite e tutte le colture orticole con esclusione dello spinacio	Varie		Dodina	Utilizzo revocato

ALLEGATO N. 2 . Integrazione alle Linee Guida Nazionali 2013 per la difesa integrata delle colture ed il controllo integrato delle infestanti delle Colture da seme

Coltura/Scheda	Avversità	s.a. Inserire	s.a Escludere	Note e Limitazioni
Cavoli a infiorescenza pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a testa pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a foglia pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cipolla pc	Nottue, tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo pc e cp	Nottue fogliari, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi, altica, nottue fogliari, atomaria, cassida, mamestra, cleono	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Erba medica	Apion, fitonomo	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Lattuga pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno

Cicoria pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Radicchio pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia scarola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Cicoria pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Prezzemolo pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Finocchio pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Lattuga	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cetriolo pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.

Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	IBE		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	QoI		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Orzo	Diserbo	Fenoxaprop-petyle		Inserire alle condizioni previste per il frumento
Vite	Tripidi - Nottue Val D'Aosta		Cyflutrin	Esclusione
Vite	Scafoideo	Buprofezin		Inserire alle condizioni previste per la cocciniglia
Lattuga e bietola da costa	Varie		Pencicuron	Revocato
Cavolo rapa e cavolo a foglia	Varie	Lambdacialotrina		In alternative e nei limiti previsti per i piretroidi
Tutte le colture orticole con esclusione dello spinacio	Varie		Dodina	Utilizzo revocato

ALLEGATO N. 3 . Linee Guida Nazionali 2013 per la difesa integrata ed il controllo integrato delle infestanti del coriandolo da seme

Controllo delle infestanti: non è ammesso l'impiego di prodotti fitosanitari

Difesa integrata:

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto		
Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - interrimento in profondità dei residui vegetali contaminati - ampi avvicendamenti colturali - uso oculato delle irrigazioni - impiego di seme sano oppure conciato		
Marciumi basali (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto - ampi avvicendamenti colturali - evitare ristagni idrici		
Calcidide (<i>Systole albinennis</i> , <i>Systole coriandri</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - raccolta precoce		
Depressaria (<i>Depressaria marcella</i>)	<u>Interventi agronomici :</u> - ampi avvicendamenti colturali		
Carabidi (<i>Carterus fulvipes</i> e altri carabidi entomopatogeni)	<u>Interventi agronomici:</u> Lavorazione immediata dopo la trebbiatura del seme per abbattere la popolazione ancora presente in campo		

Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	<u>Interventi chimici:</u>	Metossifenozone	(1) Al massimo 1 intervento all'anno
	- Presenza		
Afidi (<i>Hyadaphis coriandri</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - concimazioni azotate equilibrate		
Limacce (<i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Arion</i> spp.)	<u>Interventi chimici:</u> Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali. Impiego di esche	Fosfato ferrico	Con attacchi sui bordi dell'appezzamento effettuare la distribuzione sulla fascia interessata.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - effettuare ampi avvicendamenti colturali		I nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi