

ALLEGATO 2

Nuove Schede Regione Toscana - Anno 2011

- Zucca

SCHEMA DIFESA – ZUCCA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		Prodotti rameici Propamocarb Dodina		
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)		Zolfo Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Penconazolo (IBE) (2) Tebuconazolo (IBE) (2) Miclobutanil (IBE) (2) Bupirimate		(1) Strobilurine: max 2 trattamenti anno, indipendentemente avversità (2) IBE: max 2 trattamenti anno, indipendentemente avversità
Moria delle piantina (<i>Pythium spp.</i>)	1	<i>Tricoderma asperellum</i> Propamocarb		
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)		Prodotti rameici		
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)		Prodotti rameici		
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)		Piretro naturale Flonicamid (1) Imidacloprid (Neonicotinoidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2)		(1) Flonicamid: max 1 per ciclo colturale indipendentemente avversità (2) Neonicotinoidi: max 1 per ciclo colturale indipendentemente avversità
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> Etoxazole Exitiazox		

SCHEMA DISERBO – ZUCCA

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Glifosate Glufosinate ammonio	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7