La dinamica del Carbonio nei suoli MESCOSAGR: aspetti biochimici

Marco Trevisan
Edoardo Puglisi
Attilio A. M. Del Re

Istituto di Chimica Agraria ed Ambientale Università
Cattolica del Sacro Cuore
Piacenza

marco.trevisan@unicatt.it

Attività enzimatiche come indici di qualità del suolo:

- Misure di attività microbica strettamente legate ai cicli dei nutrienti
- Rispondono rapidamente a cambiamenti dello status del suolo dovuti a fattori naturali o antropici
- Sono considerati indicatori affidabili di alterazioni a carico della microflora del suolo
- Sono stati sviluppati indici di alterazione basati su enzimi del suolo

Acidi Grassi di Fosfolipidi (PLFA) e qualità del suolo:

- Presenti in tutti gli organismi del suolo
- Si decompongono rapidamente alla morte delle cellule

- marker specifici di gruppi tassonomici all'interno della comunità microbica
- indicatori dello status nutrizionale delle cellule (p.e., aumento di ciclo propanici in condizioni di stress)
- indicatori di cambiamenti fenotipici indotti da eventi di alterazione

Obiettivi

- Valutazione degli effetti di strategie agronomiche per il sequestro del Carbonio sulle proprietà biochimiche del suolo :
- attività enzimatiche
- struttura delle comunità microbica mediante PLFA

Strategie per il sequestro del Carbonio nei suoli agricoli:

- Minima lavorazione (**MIN**)
- Protezione della sostanza organica da parte di materiali organici come il compost (**COM**)
- Polimerizzazione ossidativa per catalisi biomimetica in presenza di metallo porfirine (**POR**)*

Queste strategie devono essere testate non solo per la loro capacità di riduzione delle emissioni di gas serra a suoli agricoli rispetto a pratiche agronomiche tradizionali (**TRA**) ma anche per i loro possibili effetti sul ciclo di nutrienti e su proprietà biochimiche indicatrici della qualità del suolo.

MATERIALI & METODI

Siti sperimentali

TORINO: suolo sabbioso-limoso

PIACENZA: suolo sabbioso-limoso-argilloso

NAPOLI: suolo limoso-argilloso

Condizioni agronomiche (4 parcelle per trattamento in ciascun sito):

TRA: urea ($N\ 130\ Kg\ ha^{-1}$) + aratura a 30 cm

MIN: urea ($N\ 130\ Kg\ ha^{-1}$) + minima lavorazione

COM: compost ($N\ 260\ Kg\ ha^{-1}$) + aratura a 30 cm

POR : come TRA + $1\ g\ m^{-2}$ di Fe-porfirina

MIN, COM e TRA sempre coltivati a mais; POR ed il suo controllo TRA (NO-POR) coltivati a frumento a Napoli e Torino, a mais a Piacenza

Esperimenti condotti per 3 annate agronomiche successive; analisi condotte su suoli campionati post-raccolta

Attività enzimatiche

Analisi dell'attività di 4 enzimi del suolo:

B-glucosidasi (GLU, E.C. 3.2.1.21)

Ciclo del C, idrolisi del legame β -1,4 in molecole glucosidiche

Fosfatasi (PHO, E.C. 3.1.3.2)

Liberazione di P inorganico con produzione di energia

Ureasi (UR, 3.5.1.5)

Ciclo del N, Idrolisi dell'urea

Invertasi (INV, E.C. 3.2.1.26)

Ciclo del C, Idrolisi del saccarosio in glucosio e fruttosio

Applicazione di un indice di alterazione in grado generalmente di discriminare correttamente tra suoli con diversi livelli di alterazione:

$$AI = 36.18 * \beta\text{-glucosidase} - 8.72 * \text{phosphatase} - 0.48 * \text{urease} - 4.19 * \text{invertase}$$

Acidi grassi di fosfolipidi (PLFA)

Identificazione e quantificazione in GC/MS di metil esteri di acidi grassi di fosfolipidi dopo loro estrazione, idrolisi ed esterificazione per saponificazione

Analisi di PLFA delle seguenti classi:

saturi

insaturi

metilati

idrossilati

ciclopropanici

Correlazione con gruppi microbici (funghi, gram-, gram+, protozoi) tramite analisi statistiche uni- e multi-variate di specifici PLFA

PLFA e gruppi microbici

GRAM +	i14:0, i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a17:0
GRAM -	cy17:0, cy19:0, 18:1 ω 9c, 16:1 ω 9c, 18:1 ω 9c, 15:1 ω 4c, 18:1 ω 7c
Funghi	18:2 ω 6c
Biomassa microbica totale	16:0
stress	cy17:0/16:1 ω 7c, cy19:0/18:1 ω 7c

Analisi statistiche

ANOVA e test di Tukey per confronti tra medie

Analisi delle componenti principali (PCA) con rotazione degli assi per massimizzare la discriminazione tra gruppi

RISULTATI

UREASI

FOSFATASI

GLUCOSIDASI

INVERTASI

- L'applicazione di metallo-porfirine non causa cambiamenti significativi nell'attività degli enzimi studiati, indipendentemente dalla coltura.
- Variazioni sito e stagione dipendenti nel livello dei singoli enzimi, con generalmente un aumento nelle prove MIN e COM. Nello specifico:
  - Aumento dell'ureasi in tutti i siti dopo il primo anno
  - Fosfatasi ed invertasi più alte in MIN a Piacenza e con variazioni stagionali a Piacenza.
  - Glucosidasi generalmente ridotta nel tempo nei 3 siti; livelli più alti nei suoli MIN a Piacenza

PLFA 16:0 - biomassa microbica totale

PLFA 18:2 ω 6c - biomassa fungina

Batteri GRAM +

- somma di i14:0, i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a 17:0

Batteri GRAM +

- somma di i14:0, i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a 17:0

Batteri GRAM +

- somma di i14:0, i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a 17:0

Batteri GRAM -

-somma di $cy17:0$, $cy19:0$, $18:1\omega9c$, $16:1\omega9c$, $18:1\omega9c$,
 $15:1\omega4c$, $18:1\omega7c$

Batteri GRAM -
-somma di cy17:0, cy19:0, 18:1 ω 9c, 16:1 ω 9c, 18:1 ω 9c,
15:1 ω 4c, 18:1 ω 7c

Batteri GRAM -

-somma di $cy17:0$, $cy19:0$, $18:1\omega9c$, $16:1\omega9c$, $18:1\omega9c$,
 $15:1\omega4c$, $18:1\omega7c$

Protozoi

somma di 20:2w6,9,c, 20:3w6,9,12c, 20:4w6,9,12,15c

Protozoi

somma di 20:2w6,9,c, 20:3w6,9,12c, 20:4w6,9,12,15c

La valutazione della struttura delle comunità microbiche valutata con i PLFA ha dato risultati coerenti con le analisi enzimatiche: variazioni sito-specifiche e stagionali nella biomassa fungina e nella struttura di alcuni gruppi microbici. Nessuna variazione di biomassa totale.

INDICE DI ALTERAZIONE

Rapporto cy19:0/18:1 ω 7c - indice di stress

Conclusioni

- L'applicazione di un indice di alterazione basato sui 4 enzimi studiati così come il rapporto $cy19:0/18:1\omega7c$ (indice di stress) indicano che nessuna delle pratiche agronomiche testate induce alterazioni a carico delle attività biochimiche del suolo.
- Gli effetti della località e della stagione sono generalmente più marcati di quelli del trattamento.