

DISERBO RISO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Clomazone	30,4 31,40	1,5 – 3 0,7 - 1	
	Giavone	Thiobencarb	90	3 - 4	Utilizzabile su risaia allagata o asciutta;
	Eterantera	Oxadiazon	34,1	0,65 - 1,3	Impiegare quando nell'anno precedente si siano avuti consistenti infestazioni di Eterantera. Prodotto parzialmente attivo anche su Giavone, Scirpus e Cyperus da seme. Dopo 1-2 gg dal trattamento sommergere il terreno.
	Alghe	Prodotti rameici			Avversità controllabile con l'asciutta
	Riso crodo	Flufenacet Ciclossidim Propaquizafop Glifosate (1)	60 10,9 9,7 37,7	0,6 - 0,7 4 1 0,8 - 1,5	(1) Interventi soprachoma con prodotti specificatamente registrati
Altre fasi	Giavone	Azimsulfuron Clomazone (1) Cyalofop-butile Imazamox (2)	50 31,40 20,92 3,70	0,04 - 0,05 0,5 - 0,7 1 - 1,5	(1) Interventi in post emergenza precoce (2) S.a registrata solo per la varietà Libero (Autorizz. 10926 del 15.05.2001)
	Graminacee	Penoxsulam Proxodim (1) Bispyripac-sodium Thiobencarb (2) (Fenoxaprop-p-etile+ isoxadife-etile)	80 2,19 19,8 35 90 (6,77 + 7,28)	4 - 6 2 0,4 - 0,6 0,060 - 0,075 3 - 4 1,25	(1) Al massimo 1 intervento all'anno solo sul 50% della superficie investita a riso. Qualora si impieghi tale prodotto la dose massima di impiego del Propanil (80% di s.a.) non deve superare i 5 kg/ha all'anno (2) in post emergenza precoce
	Ciperacee, Alismataceae e Butomaceae	Bensulfuron-metile Imazosulfuron Etoxisulfuron Halosulfuron metile (1)	60 10 60 75	0,1 0,7 - 0,8 0,1 0,3 - 0,4	(1) Controlla inizialmente anche Eterantera
	Ciperacee, Giavone, Alismataceae e Butomaceae	MCPA Penoxsulam Orthosulfamuron (1)	25 2,19 50	1,5 2 0,12 - 0,15	(1) Efficace anche su Eterantera
	Ciperacee, Eterantera,	(Bensulfuron-metile + Metsulfuron-metil)	(50 + 2)	0,1	