

DISERBO SPINACIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil	81,48	0,4 - 0,8	Usare la dose inferiore nei terreni sciolti
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil (1) S-metolachlor	81,48 86,49	0,4 - 0,8 0,4 - 0,5	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sciolti
Post emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifam Fenmedifam + Lenacil	15,84 15,84+81,48	1 - 2,5 1-2 + 0,3-0,5	Eseguire dei saggi preliminari per verificare la selettività
	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop (1) Diclofop-metile (1) (2)	4,9 5 10,9 9,7 27	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5 1 2,5	(1) 30 giorni di carenza (2) Non utilizzare formulati classificati Xn Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta