

**DISERBO FRUMENTO DURO E ORZO**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,40	1,5 - 3	<b>(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Post emergenza precoce</b>	Graminacee e Dicotiledoni	(Pyraflufen etile + Bifenox) (1) Diflufenican	(0,76 + 42,2) 42,0	1 - 1,3 0,3	(1) Su alcune cvs possono provocare leggera fitotossicità. Sull'apparato fogliare possono apparire ustioni puntiformi di carattere transitorio e senza riflesso alcuno su sviluppo e produttività. L'orzo è + soggetto.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin	35	0,2	<b>Solo in miscela con altri diserbanti di post emergenza, in terreni particolarmente infestati da papavero e cardo</b>
	Graminacee	(Fenoxaprop-p-etile+ Mefenpir-dietile) (1)	(5,24 + 2,86)	0,7 – 1,5	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		Tralkoxidim	34,67	1,0	
		Pinoxaden + Cloquintocet-Mexyl Diclofop-metile	9,71 + 2,43 27,00	0,45 2 - 2,5	
		(Pinoxaden + Clodinafop-propargil+ Cloquintocet-Mexyl) (1) Clodinafop-propargil + Cloquintocet- Mexyl (1)	(9,5 + 9,5 + 2,38) 22,3 + 5,60	0,2 – 0,25 0,25	
	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile	75,0	0,050 - 0,080	<b>(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico</b> (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
		Metsulfuron metile	20,0	0,015 – 0,020	
		Tribenuron-metile	50,0	0,020 – 0,030	
		Triasulfuron	20,0	0,037	
	Dicotiledoni con Galium e Graminacee	Tritosulfuron (1)	71,4	0,05 - 0,07	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		Tritosulfuron + Dicamba (1)	25,0 + 50,0	0,12 - 0,20	
		Metil oleato + Metil palmitato (2)	37,5	0,50	
		(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-etile+ Mefenpir-dietile) (1)	(0,78+6,22 + 2,33)	1,25	
	Dicotiledoni con Galium e Graminacee	(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron metile) (1)	(0,60 + 3)	0,50	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		Pyroxulam+Florasulam+ Cloquitocet mexyl (1)	(7,08 + 1,42 + 7,08)	0,265	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
	Dicotiledoni Con Galium	Florasulam (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) Amidosulfuron Fluroxipyr	4,84 (1,8 + 18,2 + 3,6) 75 17,16	0,1 - 0,125 4 0,02 – 0,04 0,8 – 1,0	(1) Su alcune cvs possono provocare leggera fitotossicità

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti