

# DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	7,5	<p>Le dosi impiegate si intendono per ettaro. La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.</p> <p>(1) Su agrumi al massimo 6 l/ha/anno. (2) Non ammesso su agrumi. (3) Quando utilizzato in miscela impiegare dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri/ha)</p>
		Oxifluorfen (2) (3)	23,8	1	
	Dicotiledoni	MCPA (1) Fluroxiypir (2) Carfentrazone (3) (4) (5)	25 20,6 6,45	1,5 1,5 1	<p>(1) Efficace su convolvolo (1) Ammesso solo su melo e pero (2) Ammesso solo su melo e pero (3) Ammesso solo su melo, pero, pesco, susino, olivo, agrumi (4) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento (5) Efficace come spollonante ammesso su melo, pero e olivo</p>
	Graminacee	Ciclossidim (1) (2)	10,9	2 - 4	<p>(1) Drupacee: solo albicocco e pesco (2) Non ammesso su agrumi e olivo</p>

Nota: su noce, nocciolo e castagno, il diserbo chimico non è ammesso.