

## DIFESA FAGIOLO

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Marciumi basali</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) ( <i>Sclerotinia minor</i> ) ( <i>Fusarium spp.</i> ) ( <i>Rhizoctonia spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Ricorrere alla solarizzazione in coltura protetta; -Si consiglia di impiegare seme conciato. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire in caso di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle patologie, bagnando bene la base delle piante.	Toclofos – metile (1)	<b>(1) Massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; autorizzato solo per Rhizoctonia e Sclerotinia</b>
<b>Antracnosi</b> ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Utilizzare seme sano e conciato; -Utilizzare varietà resistenti o tolleranti. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire in caso di condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità).	Prodotti rameici	I prodotti rameici sono efficaci anche contro le batteriosi.
<b>Alternariosi</b> ( <i>Alternaria spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Utilizzare seme sano e conciato; -Utilizzare varietà resistenti o tolleranti. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire in caso di condizioni particolarmente favorevoli alla malattia.	Prodotti rameici Toclofos – metile (1)	<b>(1) Massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Peronospora</b> ( <i>Plasmopara crustosa</i> ) ( <i>Phytophthora syringae</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Distruggere i residui delle colture ammalate; -Distanziare maggiormente le piante; -Utilizzare varietà resistenti o tolleranti. <b>CHIMICO:</b> I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	Prodotti rameici	
<b>Botrite</b> ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )	<b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed al perdurare delle condizioni climatiche favorevoli.</b>	Prodotti rameici	
<b>Ruggini</b> ( <i>Uromyces appendiculatus</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Interventi da effettuarsi con andamento stagionale favorevole alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C).	Prodotti rameici Zolfo Azoxistrobin (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi con questo prodotto indipendentemente dall'avversità</b>

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Batteriosi</b> ( <i>Pseudomonas phaseolicola</i> ) ( <i>Xanthomonas phaseoli</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Impiego di seme sano; -Concimazioni azotate e potassiche equilibrate; -Eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante; -Non irrigare con acque provenienti da bacini che non vengono ripuliti da residui organici. <b>CHIMICO:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	
<b>VIROSI</b> ( <i>CMV, BYMV, BCMV</i> )	-Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo, CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi; -Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante.	Induttori di resistenza	
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Minatrice</b> ( <i>Lyriomiza spp.</i> )	<b>MECCANICO:</b> -In coltura protetta utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti; -utilizzare pannelli gialli invischiati di colla per la cattura massale degli adulti. <b>CHIMICO:</b> -Non esistono S.a. e prodotti registrati per il controllo della minatrice. <b>BIOLOGICO:</b> -Lancio dell'ausiliario (nella dose adeguatamente determinata e suddivisa in due tre lanci) determinato in base alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago catturati con trappole cromotropiche.	<i>Diglyphus isaea</i>	
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis fabae</i> ) ( <i>Myzus persicae</i> ) ( <i>Acyrtosiphon pisum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Per contenere focolai d'infestazione preservando gli ausiliari, è possibile effettuare lavaggi con prodotti tensioattivi specifici. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire alla comparsa delle prime colonie in accrescimento.</b>	Alfacipermetrina (1) Ciflutrin (1) Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1) (2) Fluvalinate (1) (2) Imidacloprid (3) Acetamiprid (3)	<b>Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Non utilizzare in serra</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi</b>
<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> ) ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	<b>MECCANICO:</b> -In coltura protetta utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti; -Utilizzare pannelli gialli invischiati di colla per la cattura massale degli adulti. <b>FISICO:</b> -Utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire in caso di infestazione generalizzata.</b>	Deltametrina (1) Ciflutrin (1)	<b>Gli interventi contro questa avversità sono ammessi solamente in coltura protetta</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella intonsa</i> )	<b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire solo in caso di grave infestazione generalizzata (8 –10 individui per fiore).</b>	Acrinatrina (1) Deltametrina (1) Ciflutrin (1) Lambda-cialotrina (1) (2)	<b>Al massimo 1 intervento contro questa avversità</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Non utilizzare in serra</b>

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mosca</b> ( <i>Delia platura</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Impiegare seme con buona energia germinativa; -Effettuare semine non troppo precoci; -Adottare semine non profonde; -Seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina. <b>CHIMICO:</b> -Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti; -Intervenire in caso di accertata presenza nelle prime fasi di sviluppo della pianta.	Deltametrina (1) Teflutrìn (2) (3)	(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Localizzato al trapianto lungo la fila (3) Non utilizzare in serra
<b>Nottue fogliari</b> ( <i>Mamestra oleracea</i> ) ( <i>Polia pisi</i> ) ( <i>Autographa gamma</i> ) ( <i>Spodoptera Spp.</i> ) (ecc..)	<b>CHIMICO:</b> -In caso di accertata presenza.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina (1) Cilflutrìn (1) Lambda-cialotrìna(1) (2)	(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Non utilizzare in serra
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Infestazione diffusa a pieno campo su larve ancora in piena attività, se non si sono approfondite nel terreno.	Cilflutrìn (1) Deltametrina (1)	Al massimo 1 intervento contro questa avversità (1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Piralide del mais</b> ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	<b>CHIMICO:</b> -In caso di accertata presenza.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina (1) Cilflutrìn (1) Lambda-cialotrìna(1) (2) Spinosad (3)	(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Non utilizzare in serra (3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale contro questa avversità
<b>Ragnetto rosso</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire nelle prime fasi dell'infestazione in caso di presenza accertata (2 – 3 forme mobili per foglia).	Acrinatrìna (1)	(1) Al massimo 2 interventi con Piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Calocoride</b> ( <i>Calocoris novergicus</i> )	-Non si rendono necessari trattamenti specifici.		I Piretroidi impiegati contro le altre avversità sono efficaci anche nel controllo dei Calocoridi
<b>Insetti terricoli</b> <b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -In caso di terreni sicuramente infestati.	Teflutrìn (1) (2)	(1) Intervento localizzato al trapianto lungo la fila (2) Non utilizzare in serra
<b>Chioccioline e limacee</b> ( <i>Helix spp.</i> ) ( <i>Cantareus aperta</i> ) ( <i>Helicella variabilis</i> ) ( <i>Limax spp.</i> ) ( <i>Agriolimax spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Solo in caso di infestazione generalizzata; -Distribuire il prodotto in formulazione granulare sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate.	Metaldeide - esca	
<b>Nematodi galligeni</b> ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Utilizzo di varietà resistenti o tolleranti; -Solarizzazione in coltura protetta; -Utilizzo in precessione colturale di specie da sovescio con attività bio-nematocida.		