

## DISERBO RADICCHIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Glufosinate - ammonio	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	<b>(1) Solo trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto.</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1) Clorprofam	36 40,8	3 - 4 4	<b>(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.</b> Interrare i prodotti dopo la distribuzione
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	1 - 1,5	<b>Non utilizzare in terreni sciolti</b>
<b>Pre emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop - p - etile Quizalofop - etile Isomero D	21 9,7 5 4,9	2 1 1 - 1,5 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***