

DISERBO CAVOLFIGLIORE E CAVOLO BROCCOLO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina e Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di colture Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Oxifluorfen Oxadiazon (1) Napropamide (2) Pendimetalin (3)	43,2 22,9 34,1 41,85 31,7	6 1,5 - 2,5 1,2 2 - 3 2 - 3	(1) Ammesso solo su cavolfiore (2) Ammesso solo su cavolfiore (3) 100 giorni di carenza
Post - trapianto	Dicotiledoni annuali	Clopiralid	9	1,2 - 1,5	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor (1)	43,10 43,2	1,5 6	(1) Trattare su infestanti che non abbiano superato la fase di plantula (
	Graminacee	Cicloxidim (1) Propaquizafop (2) Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D (1) Diclofop - metile (3) Fluazifop-p-butile	21 9,7 5 4,9 26 13,3	0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5 2,5 - 3 1 - 1,5	(1) Ammesso solo su cavolfiore (2) Ammesso solo su broccoli (3) Non utilizzare formulati classificati Xn