

# DISERBO BIETOLA DA COSTE

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) S-Metolaclo (2)	44,37 87,3	3 1 - 1,5	<b>20 giorni di carenza</b> <b>(1) Non ammesso su bietola da foglia</b> <b>(2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto</b>
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) (2) (3)	44,37	0,5 - 3	<b>20 giorni di carenza</b> <b>(1) Non ammesso su bietola da foglia</b> <b>(2) Intervenire con la coltura a 2 foglie vere</b> <b>(3) Le dosi più basse possono essere utilizzate in post emergenza precoce con interventi ripetuti</b>

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***