

DISERBO INDIVIA SCAROLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Benfluralin (2)	30,4 19,20	1,5 - 3 6,50	(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto. Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. Utilizzare in presenza di infestanti emerse (2) Interrare il prodotto dopo la distribuzione
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	1 -1,5	Non in utilizzare in terreni sciolti
Pre e post semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	3 - 4	(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop - p - etile	21 9,4 5	0,5 - 1,25 1 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta