

DISERBO CIPOLLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di colture Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Cloridazon (2) (3)	31.7 65	2 - 3 1	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sabbiosi (2) Non impiegabile su terreni limosi (3) Al massimo 2,6 kg di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo
Pre - trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	31.7	2 - 4	Effettuare l'intervento su terreno ben preparato facendo seguire una leggera irrigazione e procedere al trapianto dopo almeno 7 - 8 giorni dall'intervento.
Post emergenza e Post trapianto	Dicotiledoni annuali	Ioxinil	33.2	0,1 - 0,6	Utilizzabile anche in epoca precocissima, utilizzando le dosi più basse Indicato per cipolle autunnali
	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen (1)	22	0,05 - 0,5	(1) Intervenire su colture dopo le 2 foglie vere Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti
	Dicotiledoni perennanti	Clopiralid	75	0,15	Da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera, utilizzando dosi frazionate in proporzione allo sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D Diclofop-metile (1) (2)	6,64 21 9,7 5 4,9 26	1 - 1,5 0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5 2,5 - 3	(1) Non utilizzare formulati classificati Xn (2) Solo formulati al 26%