

## DISERBO FINOCCHIO

| <i>Epoca d'impiego</i>                         | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i>                                                 | <i>% di S.a.</i>             | <i>l o kg /ha</i>                | <i>Limitazioni d'uso e note</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre semina<br/>e<br/>Pre trapianto</b>      | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate                                                              | 30,4                         | 1,5 - 3                          | Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto<br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pre emergenza<br/>e<br/>Pre trapianto</b>   | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Pendimetalin (1)<br>Linuron<br>Oxadiazon<br>Clomazone (2)              | 31,7<br>37,6<br>34,1<br>31,4 | 2 - 3<br>0,5 - 1<br>1 - 2<br>0,3 | (1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione. Non effettuare il trapianto prima di 7 - 8 gg dal diserbo<br>(2) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca                                                                                                                                          |
| <b>Post emergenza<br/>e<br/>Post trapianto</b> | Dicotiledoni<br>e<br>Graminacee | Pendimetalin (1) (2)<br>Linuron (2)<br>Clomazone (3)<br>Clorprofam (4) | 34,1<br>37,6<br>31,4<br>40,8 | 2 - 3<br>0,5 - 1<br>0,3<br>4     | (1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione<br>(2) Intervenire in post emergenza dopo la 4° foglia e in post trapianto al superamento della crisi. Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi<br>(3) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca<br>(4) Non ammesso in post trapianto |
|                                                | Graminacee                      | Ciclossidim<br>Fenoxaprop-p-etile                                      | 10,9<br>6,6                  | 1,5 - 2,5<br>1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |