

INTEGRAZIONI ALLE NORME GENERALI - NORME COMUNI DI COLTURA

Punto 1 bis da introdurre

1bis. Ratticidi

E' consentito l'impiego di ratticidi regolarmente registrati per questo impiego, quali il Bromadiolone. Si raccomanda di disporre le esche in modo che siano inaccessibili ai bambini ed a specie diverse dal bersaglio quali animali domestici o uccelli selvatici. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti "Attenzione derattizzazione in corso". Terminata la disinfestazione le esche residue devono essere distrutte o eliminate secondo le norme previste.



INTEGRAZIONI ALLE NORME DI COLTURA

Coltura	Aversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Frumento tenero e duro	Septoria, Oidio, Ruggine	Picoxystrobin		Nel limite complessivo dei fungicidi impiegabili in un anno.
Mais	Elatideri	Clothianidin		Ammesso nel nord Italia e nelle regioni Sardegna, Umbria e Marche. Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Mais	Elatideri	Cipermetrina		Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Colza	Meligete e Altica	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Erba medica	Fitonomo	Cipermetrina		Nel limite complessivo di 1 intervento insetticida indipendentemente dall'avversità
Aglio	Tripidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Melone, cocomero	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Bietola rossa	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Carota	Nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Cavoli a testa	Nottue fogliari e afidi, Tignola delle crucifere e Aleurodidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.
Fagiolo	Afidi e nottue fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta.

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Melanzana	Notte terricole	Cipermetrina		1 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Ravanello	Afidi e Notte fogliari	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Scalogno	Tripidi	Cipermetrina		2 all'anno in alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Vite	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei Ditiocarbammati.
Patata	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Pomodoro cp e pc	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Lattughe e simili pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Cetriolo	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Zucchini	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Melone	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA
Patata	Peronospora	Dimetomorf + Metiram		Nei limiti dei CAA e dei ditiocarbammati

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Vite	Muffa grigia e marciume acido	Bacillus amyloliquefaciens		
Pero e Melo	Erwna amylovora	Bacillus amyloliquefaciens		
Pero	Maculatura bruna	Bacillus amyloliquefaciens		
Fragola	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens		
Lattuga e simili	Sclerotinia e peronospora	Bacillus amyloliquefaciens		
Pomodoro, Peperone, Melanzana	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens		
Melo e Pero	Afidi	Sali potassici di acidi grassi		
Melo e Pero	Psilla	Sali potassici di acidi grassi		
Pesco	Afidi	Sali potassici di acidi grassi		
Vite	Cicaline	Sali potassici di acidi grassi		
Pomodoro	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Peperone	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Melanzana	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		

Coltura	Aversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Melone	Afidi, Aleurodidi	Sali potassici di acidi grassi		
Cetriolo	Afidi, Aleurodidi	Sali potassici di acidi grassi		
Basilico	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Mais dolce	Elateteridi	Cypermethrina		Alle condizioni già previste per i geodisinfestanti
Pomodoro cp, melanzana cp, fagiolino cp, cetriolo cp, Fragola cp	Ragnetto rosso	Pyridaben		Alle condizioni previste per la difesa dagli acari
Funghi	Varie		Tiabendazolo	Revocato
Ratticida	Bromadiolone	Precauzioni		Inserito nelle norme generali con indicazioni sulle modalità di utilizzo
Pomodoro cp	Botrite del fusto	Imazil		
Mais	Diabrotica	Indoxacarb		Nei limiti previsti dalle LGN
Barbabietola	Nottue	Indoxacarb		Nei limiti previsti dalle LGN

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca	Concentrazione	Dose ha Kg. - L/ha	Limitazioni e Note
Soia	Tifensulfuron metile	Post emergenza	50	0,012	Va ridotta la dose a seguito della modifica dell'etichetta. Prima la dose era di 0,01 l/ha, ma la concentrazione era del 75% di s.a.
Mais	Tifensulfuron metile	Post emergenza	50	0,015	Va ridotta la dose a seguito della modifica dell'etichetta. Prima la dose era di 0,01 l/ha, ma la concentrazione era del 75% di s.a.
Frumento tenero e duro	Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Amidosulfuron + Mefenpyr Diethyl	Post emergenza	14 + 0,83 + +6,00 + 6,70	0,333	
Frumento tenero e duro	Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr Diethyl		16,8 + 1,00 + 8,00	0,4	
Mais	Tembotrione + Isoxadifen-ethyl	Pre emergenza e post precoce	4,4 + 2,2	2	
Mais	Isoxaflutolo + Cyprosulfamide	Pre emergenza e post precoce	4,4 + 4,4	1,7 - 2	
Mais	Isoxaflutolo + Thiencarbazone + Cyprosulfamide	Pre emergenza e post precoce	3,97 + 1,59 + 2,62	2	Al massimo un intervento all'anno

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca	Concentrazione	Dose ha Kg. - L/HA	Limitazioni e Note
Erba medica, Asparago, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo, Cavolfiore, aglio, scalogno, erbe fresche, prezzemolo, foglie di sedano, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, mais dolce, pisello, cece, fagiolo, Fagiolino, Basilico	Piridate	Post emergenza e Post trapianto			Al massimo 2 kg. all'anno
Patata	Metribuzin + Clomazone	Pre-emergenza	19,3 + 4,97	1,5	
Soia	Metribuzin + Clomazone	Pre-emergenza	19,3 + 4,97	1,5	
Patata	Napropamide		41,85	2 - 3	
Pomodoro	Napropamide		41,85	2 - 3	
Melanzana	Napropamide		41,85	2 - 3	
Foglie e steli di brassica		Propizamide			