



**Aggiornamento delle
"Linee Tecniche di Difesa Integrata" del Veneto per l'anno 2013**

MODIFICHE ALLE NORME GENERALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire o modificare	Limitazioni e Note
ORTICOLE			
Aglio	Tripidi	Beta-ciflutrin	Nei limiti previsti per l'avversità
Basilico	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Bietola da coste e da foglia	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Cavoli a infiorescenza Cavoli a testa Cavoli a foglia (pieno campo)	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo coltura protetta	Nottue fogliari, tripidi, afidi, aleurodidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo pieno campo	Afidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cicoria	Afidi	Spirotetramat	Esteso l'impiego al pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno
Cicoria pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno
Cipolla pieno campo	Nottue, tripidi, afidi,	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cocomero (solo in serra)	Ragnetto rosso	Spiromesifen	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Erbe fresche	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Fagiolo e Fagiolino in pieno campo	Nottue fogliari, tripidi, afidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolo	Oidio	Azoxystrobin + Difeconazolo	Con il limite di 2 interventi all'anno. Inserita anche l'avversità
Finocchio	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Fragola pieno campo	Vaiolatura	Dodina	
Indivia riccia e scarola	Afidi	Spirotetramat	Esteso l'impiego al pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia e scarola pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire o modificare	Limitazioni e Note
Lattuga	Afidi	Spirotetramat	Esteso l'impiego al pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno
Melanzana pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi,	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Melanzana pieno campo	Afidi	Spirotetramat	Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Melone (solo in serra)	Ragnetto rosso e Aleurodidi	Spiromesifen	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone pieno campo	Peronospora	Ametoctradina + Metiram	Massimo 2 interventi all'anno con Ametoctradina e 2 all'anno con ditiocarbammati
Patata	Tignola	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Patata	Tignola	Thiacloprid	Al massimo 1 intervento all'anno
Patata	Peronospora	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa a Cyazofamide
Peperone	Piralide	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Peperone	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Pisello pieno campo	Mamestra, afidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pomodoro pieno campo	Peronospora	Ametoctradina + Metiram	Al massimo 3 all'anno con ametoctradina e 3 per i ditiocarbammati
Pomodoro pieno campo	Afidi	Esfenvalerate	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pomodoro pieno campo	Afidi	Spirotetramat	Al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Pomodoro coltura protetta	Peronospora	Ametoctradina + Metiram	Al massimo 3 all'anno con ametoctradina e 3 per i ditiocarbammati
Prezzemolo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Radicchio	Afidi	Spirotetramat	Esteso l'impiego al pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno
Radicchio pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno
Rucola	Afidi	Spirotetramat	Massimo 2 interventi all'anno
Rucola pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno
Scalognolo pc	Tripidi, afidi	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Sedano	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Spinacio	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 2 interventi
Zucca (solo in serra)	Ragnetto rosso	Spiromesifen	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità



Coltura	Avversità	Prodotto da inserire o modificare	Limitazioni e Note
ESTENSIVE			
Barbabietola	Afidi, altica, nottue fogliari, atomaria, cassida, mamestra, cleono	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Nottue	Esfenvalerate	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Colza	Afidi, Meligete	Esfenvalerate	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Colza	Diserbo post emergenza	Imazamox + Metazacior	Per specifiche varietà autorizzate. 2 litri/ha per conc. della s.a. rispettivamente dell'1,6 e del 33,5%. Impiegabile 1 volta ogni 3 anni
Mais	Nottue, diabrotica, piralide	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais dolce	Nottue, diabrotica, piralide	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Sorgo	Diserbo di pre emergenza	Terbutilazina 25% + Pendimetalin 5,9%	Alla dose di 2,5 l./ha
Tabacco	Nottue, afidi, pulce	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
FRUTTICOLE			
Actinidia	Cancro batterico PSA	Bacillus amyloliquefaciens, ceppo D 747	Massimo 6 interventi all'anno.
Actinidia	Cancro batterico PSA	Acibenzolar-S-methyl	Massimo 6 interventi all'anno. Prodotto con autorizzazione temporale limitata. Impiegabile solo dal 12 aprile al 10 agosto 2013.
Albicocco	Batteriosi	Prodotti rameici	Possibilità impiego di specifico formulato registrato per uso in vegetazione per max 4 interventi all'anno
Ciliegio	Batteriosi	Prodotti rameici	Possibilità impiego di specifico formulato registrato per uso in vegetazione per max 4 interventi all'anno
Ciliegio	Rhagoletis cerasi	Acetamiprid	Nei limiti previsti per i neonicotinoidi
Melo	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron	Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Melo	Varie	Metossifenozone	Limitato a 3 interventi all'anno
Olivo	Mosca	Attrack and kill con Deltametrina	
Pero	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron	Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Pero	Varie	Metossifenozone	Limitato a 3 interventi all'anno
Pesco	Batteriosi	Prodotti rameici	Possibilità impiego di specifico formulato registrato per uso in vegetazione per max 4 interventi all'anno
Pesco	Cydia molesta, Anarsia	Triflumuron	Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Pesco	Cidia, Anarsia	Metossifenozone	Limitato a 2 interventi all'anno
Pesco	Ceratitis capitata	Acetamiprid	Nei limiti previsti per i neonicotinoidi

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire o modificare	Limitazioni e Note
Susino	Batteriosi	Prodotti rameici	Possibilità impiego di specifico formulato registrato per uso in vegetazione, per max 4 interventi all'anno
Susino	Cydia funebrana, cydia molesta	Triflumuron	Al massimo 2 interventi all'anno
IV GAMMA			
Dolcetta	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Foglie e germogli di brassica	Afidi	Spirotetramat	Esteso l'impiego al pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno
Lattughino	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
Spinacino	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metossifenozone	Al massimo 2 interventi
FLOR. e ORN.			
Floreali e ornamentali pc e cp	Afidi, tripidi, aleurodidi, tortricidi e bega, nottue fogliari, maggiolino	Beta-ciflutrin	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi e comunque non più di 3 all'anno
Floreali	Afidi, aleurodidi	Esfenvalerate	In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi

Correzioni refusi

Si segnala che la nota relativa all'uso del p.a. Fenpyrazamine – formulato commerciale PROLECTUS – indicato per il controllo di **muffa grigia su vite** è errata in quanto l'etichetta del prodotto prevede al massimo 1 intervento all'anno.

Integrazioni

All'allegato 3, relativo ai Centri Prova autorizzati ad effettuare i controlli funzionali delle irroratrici in Veneto, è aggiunto anche il seguente che ha ottenuto il mutuo riconoscimento:

Codice	Nominativo Centro Prova	Indirizzo	Referente
BS03	SPRAYPRECISION	Viale Rimembranze, n. 85 33082 Azzano Decimo (PN)	Paolo Peressin Tel. 320 2221793 info@sprayprecision.it p.peressin@libero.it