

REGIONE MOLISE - Assessorato Agricoltura e Foreste

 REG. UE 1698/2005 - Misura 214 - Azione 1 - MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE per l'anno **2012** (valutazione del GDI del 15/05/2012).

pag.	COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI
5	VITE	Peronospora	Ametoctradina		
6		Muffa grigia	Fludioxonil		- Al massimo 1 trattamento. - Tra Pyrimethanil, (Ciprodinil+Fludioxonil) e Fludioxonil al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		
		Marciumi acidi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		eliminazione da Criteri di intervento: Non esistendo attualmente mezzi di lotta ...
8		Cicaline	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno, indipenedentemente dall'avversità.
9		Cocciniglie	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno, indipenedentemente dall'avversità.
13	OLIVO	Cocciniglia mezzo grano di pepe	Buprofezin		<i>già presente limite di 1 trattamento l'anno contro l'avversità.</i>
19	PESCO	Cocciniglia bianca	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno, indipenedentemente dall'avversità.
		Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno, indipenedentemente dall'avversità.
22		Cicaline	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno, indipenedentemente dall'avversità.

pag.	COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI
22	PESCO	Ragnetto rosso	Acequinocil		<i>già presente limite di 1 trattamento l'anno contro l'avversità.</i>
26	ALBICOCCO	Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno.
30	SUSINO	Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età.
		Cidie	Etmectina		Al massimo 2 interventi l'anno e solo nei confronti della <i>Cydia funebrana</i>.
34	CILIEGIO	Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età. Impiegabile solo contro <i>Comstockaspis pernicios</i>.
43	MELO	Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno.
44		Ragnetto rosso	Acequinocil		<i>già presente limite di 1 trattamento l'anno contro l'avversità.</i>
49	PERO	Maculatura bruna	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		
50		Cocciniglia di S. Josè	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno.
52		Ragnetto rosso	Acequinocil		<i>già presente limite di 1 trattamento l'anno contro l'avversità.</i>
58	ACTINIDIA	Cocciniglia bianca	Buprofezin		Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire preferibilmente alla migrazione delle neanidi di prima generazione.
60 61	CEREALI	Oidio Septoria Ruggini	Picoxystrobin		

pag.	COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI
78	POMODORO	Peronospora	Ametoctradina		Al massimo 3 interventi l'anno.
80		Oidio	Cyflufenamid		<i>nota già presente:</i> Al massimo 2 interventi nei confronti dell'avversità con prodotti di sintesi.
81		Muffa grigia	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		
85		Ragnetto rosso	Acequinocil		<i>già presente limite di 2 trattamenti l'anno contro l'avversità.</i>
115	MELONE COCOMERO	Peronospora	Ametoctradina		Al massimo 2 interventi l'anno. Non ammesso su cocomero.
			Pyraclostrobin		Al massimo 2 interventi l'anno. Non ammesso su cocomero. <i>Nei limiti di QoI (2 interventi l'anno).</i>
		Mal bianco	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi l'anno.
120	PATATA	Peronospora	Ametoctradina		Al massimo 3 interventi l'anno.
124	PEPERONE	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi l'anno.
		Botrite	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		

pag.	COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI
142	ZUCCHINO	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi l'anno. Tra Mandipropamide e Dimetomorf al massimo 3 interventi l'anno.
			Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 2 interventi l'anno. <i>Nei limiti di Qol (3 interventi l'anno) e CAA (3 interventi l'anno).</i>
		Mal bianco	Quinoxifen		Al massimo 2 interventi l'anno.
			Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi l'anno.
146	LATTUGA	Peronospora	Ametoctradina + Dimetomorf		Al massimo 1 intervento l'anno.
			<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		
		Marciume basale	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		Autorizzato solo contro Sclerotinia .
149	SCAROLA	Peronospora	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		
		Marciume basale	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		Non autorizzato su Botrytis cinerea .
152	CICORIA	Peronospora	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		
		Marciume basale	<i>Bacillus amyloliquefaciens sbs. plantarum</i>		Non autorizzato su Botrytis cinerea .

pag.	COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI
155	INDIVIA	Peronospora	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		
		Marciume basale	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> .
157	RADICCHIO	Peronospora	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		
		Marciume basale	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i>		Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> .
168	RUCOLA	Peronospora	Metalaxil-M		Al massimo 2 interventi l'anno.
				Piraclostrobin + Dimetomorf	

Diserbo

pag.	COLTURA	EPOCA e Infestanti	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI DOSI
10	VITE	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
		Spollonante	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
23	PESCO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento. In alternativa al Carfentrazone.
27	ALBICOCCO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento.
32	SUSINO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento. In alternativa al Carfentrazone.
36	CILIEGIO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento.
47	MELO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
		Spollonante	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.

pag.	COLTURA	EPOCA e Infestanti	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI DOSI
53	PERO	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
		Spollonante	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 1,6 l/ha/anno. Al massimo 0,8 l/ha per trattamento e 1,6 l/ha/anno indipendentemente dall'impiego. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
63	CEREALI	Post-emergenza Dicotiledoni e graminacee	Amidosulfuron 6 + Iodosulfuron-metile 0,83+ Propoxycarbazone s. 14		dose: 0,3-0,4 kg/ha. Ammesso solo su frumento
			Propoxycarbazone s.16,8 + Iodosulfuron-metile 1		dose: 0,33 kg/ha. Ammesso solo su frumento
		Dicotiledoni		Bifenox 42,2+ Pyraflufen ethyl 0,76	<i>non in commercio</i>
			Bifenox 40,8		dose: 2 l/ha. Ammesso solo su frumento e orzo.
66	MAIS	Pre-emergenza Dicotiledoni e graminacee	Isoxaflutole 3,97+ Thiencarbazone-m. 1,59 + Cyprosulfamide 2,62		Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. dose: 1,5-2 l/ha
			Isoxaflutole 4,23 + Cyprosulfamide 4,23		Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. dose: 1,7-2,2 l/ha

pag.	COLTURA	EPOCA e Infestanti	PRODOTTI INSERITI	PRODOTTI ELIMINATI	NOTE E LIMITAZIONI DOSI
67	MAIS	Post-emergenza Dicotiledoni e graminacee	Isoxaflutole 3,97 + Thiencarbazone-m. 1,59 + Cyprosulfamide 2,62		Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. dose: 1,5-2 l/ha
			Isoxaflutole 4,23 + Cyprosulfamide 4,23		Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. dose: 1,7-2,2 l/ha
			Tembotrione 4,31		dose: 1,1-2,25 l/ha
72	GIRASOLE	Post-emergenza Dicotiledoni	Tribenuron 50		dose: 0,04 kg/ha Impiegabile solo su cultivar resistenti.
106	CAVOLI	Post-trapianto Dicotiledoni	Piridate 45		dose: 0,5-2 kg/ha
123	PATATA	pre-raccolta	Pyraflufen-ethyl 2,6		dose: 0,8 l/ha. Al massimo 1,6 l/ha/anno. Prodotto in alternativa al Carfentrazone.
189	ERBA MEDICA	Post-emergenza Dicotiledoni e graminacee	Bentazone 3,1 + Imazamox 2		dose: 1,25 l/ha

