



DISERBO SPINACIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil Metamitron	81,48 50	0,4 - 0,8 2 - 3	Usare la dose inferiore nei terreni sciolti
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil (1) S-metolachlor (2) Metamitron Cloridazon + Metamitron (3)	81,48 86,5 50 21 + 31,1	0,4 - 0,8 0,50 2 - 3 2,5 - 3	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sciolti (2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto (3) Nello stesso appezzamento al massimo 1 intervento ogni 3 anni
Pre semina Pre emergenza	Graminacee	Triallate	45	3,6	Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
Post emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifam	15,84	1,25 - 2,5	Eseguire dei saggi preliminari per verificare la selettività
	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop (1)	4,93 5 10,9 9,7	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5 1	(1) 30 giorni di carenza Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta