



DISERBO FAGIOLO

| <i>Epoca d'impiego</i> | <i>Infestanti controllate</i> | <i>Sostanza attiva</i> | <i>% di S.a.</i> | <i>l o kg /ha</i> | <i>Limitazioni d'uso e note</i> |
|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | 30,4 | 1,5 - 3 | Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Pendimetalin S-Metolaclo Clomazone | 38,72 86,49 30,74 | 1,75 1 0,2 - 0,3 | Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto |
| Post emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Imazamox (1) Pyridate (2) Imazamox + Bentazone | 3,7 45,0 43,1 + 2 | 0,5 - 0,75 1,3 - 2 1,25 | (1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno |
| | Dicotiledoni | Bentazone | 87 | 0,75 | Coltura a 2 – 3 foglie vere |
| | Graminacee | Ciclossidim Propaquizafop | 10,9 9,7 | 1,5 - 2,5 1 | |

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta