



DISERBO AVENA E TRITICALE

| <i>Epoca d'impiego</i> | <i>Infestanti controllate</i> | <i>Sostanza attiva</i> | <i>% di S. a.</i> | <i>L. o Kg/ha</i> | <i>Note</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
| Pre Semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | 30,7 | 1,5 - 3 | Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| Post emergenza precoce | Graminacee e Dicotiledoni | Diflufenican (1) | 42,0 | 0,3 | (1) Non ammesso su triticale |
| Post emergenza | Dicotiledoni con Galium | Triasulfuron (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) (1) Fluroxipyr (1) Dicamba (1) (Clopiralid + Florasulam + Fluroxipyr) (1) | 20 (1,8 + 18,2 + 3,6) 20,6 21,2 (7,69 + 0,24 + 13,85) | 0,037 4 0,7 - 0,9 0,4 - 0,5 1,5 | (1) Non ammesso su triticale |
| Post emergenza | Dicotiledoni | Tifensulfuron metile (1) Clopiralid (1) (Tifensulfuron – metile + Tribenuron-metile) Metsulfuron metile (2) | 75 75 40 + 15 20 | 0,05 - 0,08 0,1 0,08 – 0,1 0,15 – 0,20 | (1) Non ammesso su triticale (2) Non ammesso su Avena |