



## DISERBO CICORIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	<b>(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre-Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa.  Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon (1) Pendimetalin (2)	34,1 38,72	1 1 - 1,5	<b>(1) Dopo la distribuzione il prodotto deve essere interrato</b> <b>(2) Non utilizzare in terreni sciolti</b>
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1)	19,2	6,50	<b>(1) Interrare il prodotto dopo la distribuzione</b>
<b>Pre e post semina e Pre e post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	1,75 - 3,75	<b>(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.</b>
<b>Pre emergenza e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	2	
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile	10,9 9,7 5	2 - 3 1 - 1,2 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***