



**DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate (1) Glifosate + Diflufenicam (11) (12)	30,4 25 + 4	7,5 2 - 3	<p>Le dosi impiegate si intendono per ettaro. La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.</p> <p>(1) Su agrumi al massimo 6 l/ha/anno. (2) Per gli agrumi, ammesso solo su arancio, limone e pompelmo. (3) Quando utilizzato in miscela impiegare dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri/ha) (4) attivo solo sulle infestanti in fase di pre-emergenza; (5) Intervenire solo nel periodo invernale (6) Non utilizzare sul mandorlo. (7) Non impiegare su terreni sabbiosi; (8) Drupacee: ammesso solo su albicocco, pesco e susino; (9) intervenire solo su impianti in allevamento fino a tre anni; (10) Epoca e localizzazione, prestare attenzione alle disposizioni d'etichetta. (11) Non ammesso su olivo (12) Interventi ammessi solamente nei primi 3 anni d'impianto, da effettuarsi sulla fila nel periodo compreso tra la raccolta e la fioritura</p>
		Oxifluorfen (2) (3) (10) Pendimetalin (4) (5) (6) (7) (9) Oxadiazon (8) (9)	23,8 38,72 34,86	1 2 4	
	Dicotiledoni	MCPA (1) (5) Fluroxiypir (2) (3) (4) (5)	20,5 20,6	3 1,5	<p>(1) Ammesso solo su melo, pero e arancio (2) Ammesso solo su agrumi, melo, pero e olivo (3) Utilizzare anche in presenza infestante di malva e/o rovo (4) Non utilizzare su siepi di rovo posti a bordura dei campi (5) Efficace su convolvolo</p>



<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
	Monocotiledoni e Dicotiledoni  Spollonanti	Carfentrazone (1) (2) (3) (4)  Pyraflufen-ethile (5) (6) "	6,45  2,5 2,5	1  0,8 0,2 - 0,3 (7)	(1) Ammesso solo su melo, pero, pesco, susino, olivo, agrumi (2) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento (3) Efficace come spollonante ammesso su melo, pero e olivo; (4) Per i giovani impianti in allevamento è possibile innalzare la dose fino a 2 litri/anno; (5) Non utilizzare su Pero, Mandorlo, Olivo e Agrumi. (6) Ammesso come spollonante (in alternativa al Carfentrazone) e come sinergizzante (7) Le dosi inferiori devono essere considerate nell'utilizzo come sinergizzante
	Graminacee	Ciclossidim (1) (2) Fluazifop-p-butile (3) (4) (5)	10,9 13,4	2 - 4 1	(1) Drupacee: solo albicocco e pesco; (2) Non ammesso su agrumi e olivo; (3) Drupacee: non ammesso su albicocco e mandorlo; (4) Non utilizzare su terreni sabbiosi; (5) Massimo 1 intervento all'anno;

Nota: su noce, nocciolo e castagno, il diserbo chimico non è ammesso.