



## DISERBO CIPOLLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	<b>(1) Trattamenti al terreno in assenza di colture</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	38,72	2	<b>(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sabbiosi</b>
<b>Pre - trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	2	
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Dicotiledoni annuali	Ioxinil	23	0,15 - 0,85	Utilizzabile anche in epoca precocissima, utilizzando le dosi più basse Indicato per cipolle autunnali
	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Pyridate (2)	38,72 45,0	1 - 1,5 1,3 - 2	<b>(1) Intervenire su colture dopo le 2 foglie vere</b> Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti <b>(2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno</b>
	Dicotiledoni perennanti	Clopiralid	9,5	1,2 -1,5	<b>Da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera</b> , utilizzando dosi frazionate in proporzione allo sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D	21 9,7 5 4,93	0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5	