



## DISERBO FINOCCHIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Linuron (3) Oxadiazon Clomazone (2)	38,72 38,46 34,1 30,74	2,50 0,5 - 1 1 - 2 0,30	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione. Non effettuare il trapianto prima di 7 - 8 gg dal diserbo (2) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca (3) Utilizzare formulati autorizzati per quest'epoca d'impiego
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin (1) (2) Linuron (2) Clomazone (3)	38,72 37,6 30,74	2 - 2,5 0,5 - 1 0,30	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione (2) Intervenire in post emergenza dopo la 4° foglia e in post trapianto al superamento della crisi. Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi (3) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca
	Graminacee	Ciclossidim	10,9	1,5 - 2,5	